

"世達" 支氣管擴張劑
喘咳寧 錠 3公絲
(喘每特諾)
Tricoline Tablets 3 mg "S.D."
(Trimetoquinol)

衛署藥製字第 033027 號 (GMP G-2000 號)

本劑乃選擇性地作用於交感神經 β_2 受容體的支氣管擴張劑，能快速而持久的緩和呼吸道支氣管之過敏性刺激與攣縮，而對心血管與骨骼肌無不良影響。又本品能抑制"致攣縮物質"(組織胺等)之游離作用，對預防支氣管氣喘及支氣管攣縮性過敏咳嗽具有用性。

【成分】

每錠中含：Trimetoquinol Hydrochloride.....3 mg

【賦形劑】

Lactose、Corn Starch、Hydroxypropyl cellulose、Brilliant Blue F.C.F、Tartrazine、Citric Acid、Aspartame、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Orange Powder。

【適應症】

慢性支氣管炎、支氣管氣喘、塵肺症引起之呼吸道阻塞性症狀。

【用法及用量】

成人一次一錠，一天二~三次，並依年齡症狀斟酌增減，本劑須由醫師處方使用。

【藥效藥理】

①支氣管擴張作用：

Histamin，Serotonin，Acetylcholine 等靜注及迷走神經刺激所誘發之支氣管收縮，本劑與 Isoproterenol 具同程度之鬆弛效果，但作用時間較長。

②選擇性作用於支氣管 β_2 受容體，對心跳、橫紋肌、血管等作用微。

③抗過敏作用：能抑制 Histamin 之游離及 PCA 反應。

【吸收、排泄與毒性】

健康成人口服 6 mg 本劑，血中濃度 30 分可達最高點，24 小時內以甲基化一葡萄糖酸抱合物，由尿及糞排泄之。

LD₅₀=2250 mg/kg(小白鼠，經口)

【注意事項】

①一般的注意：a.依用法及用量的規定使用，亦未出現效果時，可能是本劑的使用為不適應，宜停用。又小兒投與應正確指導使用法，並要仔細觀察其經過。b.用量的持續使用可能會發生心律不整時宜減量使用或停用。

②慎重投與：甲狀腺機能亢進症、高血壓、心疾患、糖尿病。

③副作用：a.循環器系：有時出現心悸亢進或罕見血壓變動、胸部壓迫感。b.精神神經系：有時出現頭痛或罕有震顫、頭暈、熱感。c.胃腸道：有時出現噁心、食慾不振。d.過敏症：若出現發疹等過敏症時要停用。e.其他：有時出現口渴。

④相互作用：併用 Epinephrine 及 Isoproterenol 及 Catecholamine，可能會引起心律不整，應慎重並減量併服。

⑤孕婦投與：安全性未確立，應評估治療的有益性與危險性始謹慎投與。

⑥警語：本品含阿斯巴甜 (Aspartame) 賦形劑，苯酮尿症患者 (phenylketonurics) 不宜使用。

【包裝及貯存】

4~1000 粒瓶裝，25°C 以下貯存。



世達藥品工業股份有限公司
台中市西屯區工業區 15 路 2 號