# 用藥指導單張

衛教小組 DE0270101

學　名：Glimepiride 2mg,Metformin 500mg

商品名：amaryl M (複方)★2/500mg

中文名：美爾胰膜衣錠



## 一、此藥品的用途是什麼？

治療以glimepride或metformin單一藥物療法仍無法達到適當的血糖控制之第二型糖尿病患者，作為飲食和運動之外的輔助。不適合作第一線治療。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

用量：Amaryl M 之劑量係應依病患各自血液中葡萄糖的濃度來調整。建議應從最低有效劑量開始服用，再依據病患血液中葡萄糖的濃度來增加劑量。並應適當監測血液中葡萄糖的濃度。
用法：每天服藥劑量用法為一日一次或兩次於用餐前或隨餐服用。建議初始劑量為Glimepiride/metformin 2/500mg 一日一次。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

因為低血糖的危險性增加，所以在剛開始治療的第一週必須小心監測。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

## 五、此藥會造成什麼副作用？

血糖過低、頭痛、極度饑餓、噁心、嘔吐、倦怠、想睡、乳酸性酸中毒、腹瀉、脹氣。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30℃

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital Since1913

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　沙鹿院區 (04)26625111-2117
大甲院區 (04)26885599-5141

審視日期：107.02