

用藥指導單張

衛教小組 DA1180101

學名： Isosorbide mononitrate

商品名： IMDUR 60MG(心血管用藥)

中文名： 寬心持續性藥效錠



一、此藥品的用途是什麼？

預防狹心症發作。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

60mg每天一次在早晨給藥。此劑量可增加至120mg每天一次在早晨給藥。在前面2至4天中，可先以30mg來開始治療，以降低其發生頭痛之機率。此錠劑與食物可同時或分開服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 首度服用可能產生暈眩,應建議病患在駕駛或操作機器前先判斷本身對IMDUR之反應。
2. 有嚴重腦部動脈粥狀硬化及低血壓時,須嚴密觀察病人。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：

在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛，暈眩。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師