用藥指導單張

衛教小組 DH7860201

學　名：Follitropin beta

商品名：PUREGON 300IU

中文名：保妊康匣式注射溶液300國際單位



一、此藥品的用途是什麼？

(1)無排卵症(包括多囊性卵巢病患、PCOD)，且對CLOMIPHENE CITRATE之治療無反應之婦女。(2)受控制下之卵巢過度刺激，誘導多個濾泡發育，應用在各種人工協助生殖計劃。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

使用保妊康治療最先必須在具有治療生育問題經驗的專業醫師監視下執行。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.應排除未受控制的非性腺方面的內分泌疾病。
2.以性腺刺激素製劑誘導排卵後所形成之懷孕，其多胎妊娠之危險性會增加。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：
不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

臨床使用保妊康採用肌肉下或皮下注射，在注射部位可能導致淤血、疼痛、發紅、腫脹、發癢等反應，這絕大多數為輕微和短暫且是自然發生的。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍)；如發生變質或過期，不可再使用。
一旦匣式包裝的橡皮鑲嵌物已被針頭戳過，使用期限則僅剩最多28天。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital Since1913

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　沙鹿院區 (04)26625111-2117
大甲院區 (04)26885599-5141

審視日期：107.02