

★ 英文商品名：Amaryl 2mg/tab

★ 中文商品名：瑪爾胰膜衣錠

## 一.醫師為什麼會開此藥？

治療第二型糖尿病,增加體內胰島素分泌,以降低血糖。

## 二.此藥該如何使用？

1. Amaryl 是口服錠劑,請遵照醫師指示使用。

如果對此藥有任何疑問,應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。

2. 服藥時,請勿與含酒精飲料併服。

## 三.使用時我該注意的特別事項？

1. 服藥後可能會有低血糖的現象,若出現低血糖症狀時,請避免開車或操作危險機械及從事需要注意力集中的工作。

2. 服用此藥期間如需服用其它藥品時,請主動告訴您的醫師或藥師。

3. 服藥期間應定期測量並密切留意血糖變化,若血糖控制不理想,應請教醫師。

4. 老年人對本藥較敏感,服藥期間應密切注意。

5. 服藥期間請勿吸菸。

6. 務必遵照醫師與藥師指示使用,不可自行增減藥量,更改用法或停藥。

7. 服藥期間請避免長時間曝曬於太陽下,並做好防曬措施。

## 四.懷孕或哺乳時該怎麼辦？

1. 在服用本藥前,如果有懷孕或有懷孕計畫者,請務必在就診時告知醫師

2. 服用本藥不建議哺乳,必要時請與醫師或藥師討論

## 五.當忘記服用一個劑量時,我該怎麼辦呢？

若忘記服藥,於想起時立刻服用,如果已接近下次服藥時間,則不需要補服,按原時間服用即可,絕對不可一次服用兩倍劑量。

## 六. 此藥會造成什麼副作用？我該怎麼做？

1. 發生下列情況時，請停藥並立即就醫或與醫師連絡：深色尿、皮膚或眼睛變黃、胃痛併有噁心嘔吐或食慾喪失、下肢或腳踝浮腫、異常虛弱或疲倦。
2. 當您發生下列低血糖的症狀時，請與您的醫師聯絡，低血糖症狀包括：虛弱、昏昏欲睡、冒冷汗、顫抖、饑餓感、視力模糊、心悸、頭痛等。

## 七. 此藥儲存時的條件為何？

將藥物存放於容器中鎖緊，並置於小孩子拿不到的地方。將藥物儲存在室溫，遠離高溫、高溼度（不要放置於浴室）。將過期或不再需要的藥物丟棄。請教藥師如何適當處理此藥。

藥劑部 製 99 年 7 月修訂