

佛利特 護舒達 口服液

衛署藥輔字第023766號

口服鹽類緩瀉劑

Fleet® Phospho-soda® Oral Saline Laxative, Ginger-lemon Flavor

適應症：緩解偶發性便秘，手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

主要成份：

主要成份(每15ml含)	用途
Monobasic Sodium Phosphate 7.2g	鹽類緩瀉劑/腸灌洗
Dibasic Sodium Phosphate 2.7g	鹽類緩瀉劑/腸灌洗

*每茶匙(5ml)含鈉556mg，相當於每ml含鈉111.2mg。

其他成份：Flavor, Glycerin, Purified Water, Saccharin Sodium, Sodium Benzoate

作用理論：鹽類緩瀉劑能增加水份滯留於小腸，因而促進排便功能。

使用方法：

1. 醫療程序前清腸

- 依醫師指示使用本產品作為清腸劑前，請確定醫師了解您的身體狀況及本產品的警語。服用劑量請以醫師建議劑量為主，並額外多補充清流液體以補充因瀉下所流失的水分——最少240ml。
- 服用劑量：每次清腸使用二次30ml或45ml 佛利特®護舒達口服液，兩次劑量服用間隔為10~12小時。
- 每次服用方式：

年齡(歲)	步驟1	步驟2
成人、12歲以上	30~45ml.藥液加入一杯約240ml冷飲或水中，喝下	至少再喝3杯約720ml冷飲或水
10&11歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5~9歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5歲以下	不可使用	不可使用

2. 緩瀉劑

- 當作緩瀉劑緩解偶發性便秘，劑量及使用方式如下表：
- 除非醫師建議，請勿使用過量(見警語)。每次服用不可超過45ml且儘可能多喝水以補充因瀉下所流失的水分。
- 服用量及方式(便秘患者)

年齡(歲)	步驟1	步驟2	24小時最大劑量
成人、12歲以上	15ml.藥液加入一杯約240ml冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約240ml冷飲或水	45ml.
10&11歲	15ml藥液加入一杯約240ml冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約240ml冷飲或水	15ml
5~9歲	7.5 ml.藥液加入一杯約240ml冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約240ml冷飲或水	7.5ml
5歲以下	不可使用	不可使用	不可使用

警語

- 24小時內之服用劑量若超過建議劑量，可能引起傷害。
- 請勿使用於鬱血性心臟衰竭、嚴重的腎臟疾病或5歲以下小孩。
- 懷孕、授乳、限鈉飲食或有任何醫療狀況者，請詢問過醫師後再使用。
- 若您正服用處方或非處方藥品，請先詢問過醫師或藥師後再使用。
- 若您有腹痛、噁心、嘔吐、排便習慣改變持續2個禮拜、已經服用其他瀉劑治療便秘超過1禮拜，請先詢問過醫師後再使用。
- 若您直腸出血、服藥後6小時腸未蠕動或出現脫水現象時，請停止使用並詢問您的醫師。早期脫水症狀包括嘔吐、眩暈或尿量比平常少，這些症狀也許是嚴重問題的徵兆(此時請大量補充水份)。
- 請存放在孩童不易取拿之處。如果過量或意外服用，必須立刻求助醫護協助。

其他資訊

- 一茶匙(5ml)含：鈉556mg，本產品不含任何糖份。
- 一般在服用後30分鐘至6小時會產生排便(視服用劑量不同而不同)。
- 放入冰箱冷藏可增加口感，但不可冷凍。

為安全起見，本品瓶口處均密封包裝，若封口鋁箔破損或不見，請勿使用。

儲存條件：室溫25°C

有效期限：詳見盒底標示(月/年)

製造廠：
C. B. FLEET COMPANY, INC.
4615 Murray Place, Lynchburg, VA 24506-1349, U.S.A.
(Postal address: Lynchburg, VA 24502, USA)

藥商：



消費者服務專線：0800-060-689

2133000000

99.02.300000