

“晟德” 希普利敏液 0.4公絲/公撮  
Cypromin Solution "Center" 0.4mg/ml

衛署藥製字第 G-6985 號  
043588

主成份：每毫升(ml)含有

Cyproheptadine Hydrochloride.....0.4 mg

藥理作用：

本藥具有抗乙醯膽鹼和鎮靜的功能，為 Serotonin 及組織胺的拮抗劑，對一般之過敏反應，有舒緩之療效。

適應症：

皮膚疾患引起之搔癢(濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應) 枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒支氣管炎引起之咳嗽、鼻涕。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

成人：治療範圍一般每天10~50ml，大部分病患用量為每天30~40ml，視病情可加重至每天80ml，建議初使用者每日3次，每次10ml，每天最多不超過0.5mg/kg體重。

7-14歲孩童：每日2~3次，每次10ml，每天最多不超過40ml。

2-6歲孩童：每日2~3次，每次5ml，每8~12小時一次，每天最多不超過30ml。

藥物交互作用：

- 1.本藥與酒精或中樞神經抑制劑併用，具加乘作用。
- 2.MAO inhibitors會延長並加強乙醯膽鹼效果。

注意事項：

1. 新生兒、早產兒、授乳之母親及對 Cyproheptadine 或 MAOI 敏感者禁止使用本藥。
2. 青光眼、前列腺肥大、氣喘、幽門狹窄、年老虛弱之病人禁用本藥。
3. 二歲以下兒童之用量尚未建立。
4. 小孩或嬰兒服用過量會造成嗜睡、中樞神經抑制、痙攣和死亡。
5. 老年人服用本藥易造成眩暈、鎮靜和低血壓。
6. 服用本藥後應避免開車或操作機械。

**副作用：**

1. 嗜眠、噁心、下痢、腹痛、頻尿等。
2. 在血液方面有：紫斑、血小板減少、白血球減少之現象。
3. 過敏症狀：發疹、水腫、蕁麻疹、對光敏感。

**包裝：** 60~4000ml塑膠瓶裝

**貯存：**

- (1) 本品應置於兒童不及之處。
- (2) 請密封儲存於室溫，避免陽光直射。

**製造廠：**

**晟德大藥廠股份有限公司** 新竹廠  
**CENTER LABORATORIES INC.**

廠址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路2號  
公司電話：(02)2547-4332 圖文傳真：(02)2545-3562  
工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

14C04-N01