

“晟德”勝克敏液 1毫克/毫升

Cetirizine Oral Solution 1mg/ml “Center”

GMP
衛署藥製字第 G-7263 號
044023

主成份：每毫升(ml)含有

Cetirizine Dihydrochloride.....1.0mg

特 性：

Cetirizine 為 Anti-H1 之抗過敏治療劑，且無明顯的 Anti-Cholinergic 及 Anti-Serotonin 作用。
在有效劑量內 Cetirizine 不會通過腦血管障壁，對中樞神經沒有作用，不會產生安眠及行為異常等現象。

Cetirizine 的作用：

1. 迅速抑制外生性組織胺。
2. 對內生性組織胺的釋出有抑制作用(如 48/80 之組織胺)。
3. 抑制由 VIP (Vasoactive Intestinal Polypeptide) 和 Substance P 所引起之過敏反應。
4. 抑制初期皮膚過敏反應時，組織胺介質的作用。
5. 明顯抑制發炎性細胞(例如 eosinophils) 的移動，而降低遲發性皮膚過敏反應的介質釋放。
6. 顯著的降低氣喘患者的支氣管對組織胺的過度反應。
7. 降低由特殊過敏原引起的過敏反應。

這些作用，由心智測驗及 Quantified EEG 得知，對中樞神經不會產生任何作用。

藥物動力學：

口服 Cetirizine 1小時內，會達血中最高濃度。

血漿半衰期成人約為10小時，6~12歲的孩童約為6小時，3~6歲的孩童約為5小時。

成人及孩童的蓄積腎排泄量(cumulative urinary excretion)約為投藥量的三分之二。

通常孩童的血漿清除率要比成人為高。

Cetirizine 的吸收並無個體差異。體內血漿濃度與投藥量成線性關係。

Cetirizine 與血漿蛋白具有很強的結合力。

適應症：

季節性鼻炎、過敏性鼻炎、結膜炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

成人及3歲以上孩童適用。

成人及6歲以上孩童：每次10毫克(即2匙)，一天一次，於晚餐時與液體伴服。

3~6歲孩童：一天一次，每次5毫克(即1匙)，於晚餐時服用。或分別於早、晚各服用2.5毫克(即半匙)。

10毫克(= 2匙) = 10毫升

5 毫克(= 1匙) = 5毫升

2.5毫克(= 1/2匙) = 2.5毫升

腎功能不全的患者服用本藥時，其劑量應減半。

禁忌症：對主成分過敏者禁用。

副作用：

曾有報導顯示會發生輕微、短暫的主觀性副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、精神激昂、口乾、胃腸不適。但由精神運動性(psychomotor)的客觀性功能試驗結果來看，Cetirizine 的鎮靜作用發生率與安慰劑的效果相似。Cetirizine 的過敏性徵狀極少被報導。

孕婦及授乳婦：

動物實驗中，尚無引起不良反應之報告。但孕婦應避免使用本藥。

Cetirizine 會被排泄至乳汁中，因此授乳婦不可使用本藥。

藥物交互作用：

至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用鎮靜劑者，請謹慎使用。本藥應避免與過量的酒精併服。

開車或操作機械：

實驗證明，對正常人投予每天20-25 毫克的劑量，不會影響警覺及反應時間。但從事駕駛及操作機械者，請小心使用，儘量不要過量服用。

注意事項：在治療劑量下，Cetirizine 不會加重酒精(血中酒精濃度為 0.8g/L 時)的作用，但應避免。

過量：

單次劑量超過50 毫克/(50 毫升)時，會有安眠的症狀發生，無特殊之解毒劑。如有此現象發生，請儘快以灌腸法及一般急救法處理。

包裝：20~4000 ml 塑膠瓶裝

貯存：

(1) 本品應置於兒童不及之處。

(2) 請密封儲存於25℃以下，請勿冰存，並避免陽光直射。

安定性：請注意包裝上所標示的有效期限。

製造廠：

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠
CENTER LABORATORIES INC.

廠址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路2號

公司電話：(02)2547-4332 國文傳真：(02)2545-3562

工廠電話：(03)598-1829 國文傳真：(03)598-1820

14C03-N02