



便秘緩解劑

BDB-005  
衛署藥製字第09250號

永信

無秘<sup>®</sup>

栓劑

Bisacodyl

Suppositories Yung Shin



Bisacodyl為一種刺激性緩下劑，其可經由結腸粘液中神經末梢之反射作用而產生緩瀉效果。由於本藥主要之作用點在結腸，可廣泛應用於便秘之緩解。

【成分】每粒中含：

Bisacodyl.....10mg

【適應症】


軟便。

【用法·用量】

成人1次使用1個（每日可使用1個），12歲以上適用成人劑量。

栓劑不得剝半使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。



【注意事項】


1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 本藥限使用於肛門，若藥劑過軟時，請置於低溫待較硬後再使用。
6. 本藥使用時，應待便意強度持續後再行排便。若使用後立即排便，可能將本藥完全排空而導致失效。
7. 本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

【警語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
4. 使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
5. 使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
6. 除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿3歲之嬰幼兒不得使用。
7. 禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
8. 長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
9. 本藥會造成直腸刺激感、腹部不適。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處，以免誤食，造成危險。
2. 陰涼處儲存。
3. 請依外包裝標示，於有效期限內使用完畢。
4. 本栓劑之配製，旨在於體溫溶化後，即呈現效果。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化、變形等現象。尤其在夏天更易產生溶化之現象，然栓劑之效果，絕不致發生變化。如產生軟化，而致使用困難時，請按下列方法，俟凝固後再行使用。  
 (1). 栓劑之形體變形時，照原塑膠包裝形態，浸入於溫水（約40~50°C）中，軟化後再按右圖，浸於冷水（20°C以下）即可凝固。  
 (2). 栓劑如軟化或溶化時，請按右圖，浸於冷水（20°C以下）即可凝固。



【包裝】

2~100顆瓶裝、盒裝。

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中縣大甲鎮中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中縣大甲鎮日南里工九路27號

2140241

