

“杏輝”

cGMP 藥品

# 喜美 凝膠(喜普理諾)

## CIVIDOID Gel (Heparinoid) “Sinphar”

成份：每gm含：

Heparinoid Natural.....3mg  
(Heparin activity 250IU)

適應症：

鈍物創傷後之血腫，淺層性靜脈炎之局部治療。

投與方式及劑量：

投與喜美凝膠的間期及用量為何？

依據患部大小，每天二至三次，一般而言，擦上3至5公分長之藥品即足夠。

如何使用喜美凝膠？

請將喜美凝膠均勻地塗抹於患部。喜美凝膠應用於完整的皮膚，並避免與眼睛及黏膜接觸。

如同所有含酒精成分的凝膠一般，投與喜美凝膠之後不可包紮。

若用於電離子導藥療法，喜美凝膠應由陰極導入。

喜美凝膠的使用療程為何？

使用喜美凝膠應持續至病況緩解為止。鈍物創傷的治療應持續10天以上，淺層性靜脈炎則應治療1-2週。長期使用喜美凝膠並無不可，但若持續治療兩週之後病情無法獲得改善，或停藥後再復發，請諮詢您的醫師。

注意事項：

何時不可使用喜美凝膠？

當您對於Heparinoid Natural或其他相關成份過敏時，不可使用本品。

不可將喜美凝膠塗抹於傷口或受傷的皮膚。

懷孕及授乳的婦女是否可使用喜美凝膠？

就目前現有的資料顯示，懷孕及授乳的婦女使用喜美凝膠並無任何不良的情況出現。

藥物交互作用：未知

副作用：

使用喜美凝膠可能發生的副作用為何？

過敏反應如發紅等現象發生，但停藥之後即可獲得緩解。

副作用發生時的處理方式為何？

如果發生上述的副作用時，請立刻停藥並諮詢您的醫師。

如果發生的副作用是這張仿單中未提及的，煩請通知您的醫師或藥師。

藥品的保存方式：

25°C以下保存。請放置於孩童不易觸及的地方。

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第023231號

包裝：1000gm以下鋁管、塑膠瓶裝。



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

服務專線：(0800)021053-015151

website：http://www.sinphar.com

IO-280-04