

“信隆”乙醯水楊酸錠

Aspirin Tablets “Shin Lon”

【成分】 每錠含有

Acetylsalicylic acid.....300 mg

【適應症】

退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。

【用法用量】

發燒或需要時服用，若症狀持續，則每 4~6 小時可重複服用。每 24 小時內不可超過 5 次。飯後半小時內服用為宜。成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 不得併服含酒精飲料。

【警語】

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 服用本類製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。
4. 成人不得連續服用本類製劑超過 7 天，小孩不得超過 3 天，視情形需要，繼續服用本類製劑前，請洽醫師。
5. 懷孕第 1、2 期婦女：除非醫師藥師藥劑生指示，不得自行使用。懷孕第 3 期婦女：不得使用。
6. 不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。
7. 本藥不得使用於 12 歲以下兒童，亦不得使用於 18 歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病—雷氏症候群 (Reye's Syndrome) 有相關性。
8. 露豆症 (6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症, Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency) 患者，不得服用本藥。
9. 本藥含 Aspirin，應注意下列事項：
 - ① 酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為 Aspirin 可能造成胃出血。
 - ② 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。
 - ③ 可能引起胃腸不適、胃腸出血、皮膚出疹、出血傾向、氣喘、耳鳴等不適症狀。

【包裝】 2~1,000 錠塑膠罐裝。

【儲存條件】 室溫 (15~30°C) 儲存。

內衛藥製字第 11693 號



信隆藥品工業股份有限公司

Shinlon Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.

台灣・臺南市仁德區中正路三段 269 號