

“晟德”

地高新醣劑

Cardiacin Elixir

50微克/毫升

50 μ g/ml "Center"

衛署藥製字第 047126 號
GMP
G-8638

主成份：每毫升(ml)含有

Digoxin0.05 mg

適應症：

心臟衰竭、心房撲動、心房纖維顫動、陣發性上室性心搏過速。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

直接或和以開水吞服皆可，其用法如下，一日量分作3-4次服用。

年齡	初日量	維持量
1個月以上	2-4ml(0.1-0.2mg)	1ml(0.05mg)
3個月以上	4-6ml(0.2-0.3mg)	1.5-2ml(0.075-0.1mg)
12個月以上	6-8ml(0.3-0.4mg)	2ml(0.1mg)
2-3歲	8ml(0.4mg)	2-3ml(0.1-0.15mg)
4-6歲	10-12ml(0.5-0.6mg)	3-4ml(0.15-0.2mg)

副作用：

厭食、噁心、嘔吐，極少數病例可能發生精神紊亂、失語症、視覺障礙包括色幻覺。僅有特殊的病例會發生瘙癢、蕁麻疹、斑狀皮疹等。

1. 間有下列中毒症狀故應仔細觀察，如發生此項症狀時，應採取減量或停藥以及再從少量開始用藥等適當處置。

(A) 消化器：間有食慾不振、嘔吐、下痢等症狀。

(b) 循環器：間有不整脈、頻脈、高度徐脈等症狀。

(c) 眼：間有視覺異常(雖無光線但可見閃閃亮光，黃視，綠視，複視等)。

(d) 精神神經系：間有眩暈、頭痛、錯亂等症狀。

2. 過敏症：

偶發疹、風疹、紫斑、浮腫等過敏症狀，如發生此等症狀時，應停藥。

3. 其他：稀少發生女性型乳房。

注意事項：

1. 使用digoxin的病患不可注射鈣。

2. 若有冠狀動脈不全、電解質不平衡、腎臟或肝臟機能障礙時，請減低劑量。

3. 使用本劑時應仔細觀察，並確認以往2~3週前有無服用過毛地黃劑或其它強心配醣體後慎重決定投與量。

4. 下列患者不可使用

(1)患有房室 Block 及竇房 Block 者。

(2)毛地黃中毒及閉塞性心肌病患者（特發性肥大性大動脈瓣下狹窄等）。

5. 下列患者應慎重使用

急性心肌梗塞，心室性期外收縮，心膜炎，肺性心，甲狀腺機能亢進及降低症，低鉀血症。
(恐少量亦可能中毒，以及因效果不彰而過量以致中毒)。

6. 對於孕婦用藥：

因尚未建立對孕婦用藥之安全性，故應限於治療上之有益性大於可能發生之危險時始可用藥。

7. 對於兒童用藥：

因對於兒童之用藥易生副作用，應仔細觀察並慎重決定藥量。

8. 對於老年人用藥：

因對於老年人之用藥易生副作用，應仔細觀察並慎重決定藥量。

使用禁忌：

完全性房室阻滯及第二級房室阻滯，過度竇性心搏徐緩。

交互作用：

- 1.影響精神的藥物以及擬交感神經藥等，可能使服用digoxin的病患發生心律不整的機率增加。
- 2.Thiazide利尿劑、腎上腺皮質類固醇及Amphotericin B可干擾電解質的平衡，助長digoxin毒性的出現。
- 3.與下列藥物併用時，易生毛地黃中毒，故併用時，應仔細觀察，慎重給藥。
利尿劑、鈣劑、蛇根鹼系製劑、Atropine 系製劑、 β 受容體遮斷劑，交感神經刺激，甲狀腺製劑。

中毒之處理：

立即停用本品，並洗胃，連續作心電圖監測。

包裝：4-4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封避光儲存於25°C以下，請勿冰存。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-049 20120222

14C11-B01