

“應元” 鹽酸二苯胺明注射液 3%

Diphenhydramine Hydrochloride Injection 3% “Y.Y.”

【成分】 Each ml contains:

Diphenhydramine Hydrochloride.....30mg

賦形劑：Sodium chloride，Benzyl alcohol，Water for Injection

【效能】

皮膚疾患(濕疹、皮膚炎)枯草熱、過敏性鼻炎、急性鼻炎、血管神經性鼻炎。

【用法用量】

成人一日 2-3 次，每次 1ml(30mg)，皮下或肌肉注射，但必要時亦可靜脈注射。

- 1.早產兒 (premature infants) 及新生兒 (neonate) 不建議使用。
- 2.老人宜以最低有效起始劑量開始治療。
- 3.腎功能不全者應延長給藥間隔 (interval)；輕度 (GFR>50 mL/min)：間隔 6 小時；中度 (GFR 10-50 mL/min)：間隔 6-12 小時；重度 (GFR<10 mL/min)：間隔 12-18 小時。
- 4.本品以靜脈注射時，每次 diphenhydramine 之劑量以 10mg-50mg 為宜，且其注射速率不宜超過 25mg/min。
兒童不宜使用本品。
本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- 1.本品有嗜睡催眠之作用，故凡投與本品之患者，不宜從事機械之操作或開汽車、摩托車及自行車等，以免發生意外事件。
- 2.本品有下列之副作用：
 - a.精神神經系倦怠感、神經過敏、頭痛、口渴等。
 - b.消化系-噁心、嘔吐、下痢等症狀之出現。
- 3.妊婦或有妊娠可能性之婦女，使用本品時，應特別慎重。
- 4.注射時患者身體部位之選擇及注意：
 - a.肌肉注射時盡量避免傷及神經組織。
 - b.神經分佈區域避免注射。

【貯存】

請置於 25°C 以下貯存。

【包裝】

1ml x 100Amp.

**應元化學製藥股份有限公司**

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL：(06) 2654883 (代表號)