

尋常性痤瘡、面皰、青春痘最佳治療劑

愛潔膚® 乳膏 1公絲/公克(瑞婷羅)

Airful® cream 1mg/Gm Tretinoin

衛署藥製字第028021號

青春期之尋常性痤瘡(面皰、青春痘、粉刺)，是最令人煩惱之皮膚疾患，往往因情況嚴重持久，不敢面對社交活動，成為悶悶不樂之來源，愛潔膚乳膏是針對克服上項疾患之治療藥劑。

最近臨床研究證明，面皰形成之早期變化是毛囊上皮細胞形成角化層，皮脂孔阻塞，無法將過多之油脂分泌排出所致，愛潔膚乳膏可刺激上皮細胞減少形成角化層，使其容易剝落，油脂能順利分泌出，達成治療面皰、青春痘之優異療效。

【成分】每gm含：Tretinoin.....1mg(0.1%)

Cream Base Wax No. 80、Isopropyl Myristate、Stearyl Alcohol、
Propylene Glycol、Methyl Paraben、Propyl Paraben、
Butylated Hydroxyanisole、Purified Water

【藥理作用及特點】

- 1.本劑可軟化並脫去面皰粗糙表皮作用。
- 2.促進表皮細胞分裂活動之正常，抑制面皰形成。
- 3.侵入面皰周圍之厚壁，解除角化層，消除面皰。
- 4.本劑療效可深入皮膚深處，根治面皰、青春痘、粉刺。

【適應症】

治療尋常性痤瘡(面皰、青春痘、粉刺)，皮膚角質化。

【用法用量】

一般一天一次(睡前)塗勻一薄層於清洗後之患處，或用棉花棒點塗於患處，避免陽光照射，每日使用次數可依皮膚反應病況而定。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 1.對Tretinoin過敏者(紅腫水泡、結疤)請停止使用，直至皮膚回復正常。或調整用量使皮膚得以耐受。
- 2.使用期間避免日光照射，必要時可塗抹防曬產品或以衣物局部保護之。如有皮膚曬斑，請於回復後方使用本劑。
- 3.為防止與本劑產生作用，與其他藥劑併用時，請注意之。
- 4.避免與下列皮膚製劑併用：Sulfur.Resorcinol.Benzoyl peroxide.Salicylic acid.
- 5.如使用皮膚脫皮劑，請於作用消失後方始用本劑。
- 6.天氣冷、風吹會增加本劑之刺激性，請避免之。
- 7.使用時應避免觸及眼、口、鼻角及粘膜。
- 8.使用後可能引起局部紅腫及脫皮現象，如過於嚴重請減少使用次數或暫停使用。
- 9.本劑會增加皮膚濕疹者之敏感度，請注意之。
- 10.藥皂、含藥洗潔劑，肥皂，有乾燥作用之化妝品，酒精含量高的產品，收斂劑、香料、石灰石可能與Tretinoin產生作用，請注意之。
- 11.請勿一次過量使用，以防止產生紅腫、脫皮不適現象。
- 12.重覆使用本劑，偶有短暫性過高或過低色素沉著，停藥後症狀即可消失。
- 13.所有副作用於停藥後即可消失，回復正常。

【包裝】1000Gm以下管裝及罐裝，請貯於避光處。

PIC/S GMP藥廠



中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166

健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>