

寶齡 達多幫 錠 2.5 毫克 (奧斯必得寧)

Ditropan Tablets 2.5mg (oxybutynin)

**作用：**本品對平滑肌具抗收縮之作用，即抑制Acetylcholine對平滑肌之刺激作用，其Anticholinergic之作用僅為Atropine之1/5，但Antispasmodic之作用則為Atropine之4-10倍，對骨骼神經結合處及自主神經節不具破壞作用。

本劑能增加膀胱之尿容量，減少逼尿肌之收縮作用，而延長排尿時間，本劑之耐受性極佳。

**成分：**每錠中含Oxybutynin Chloride..... 2.5mg

**適應症：**因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症之緩解。

**禁忌：**不適用於患有青光眼、胃腸道阻塞、痙攣性腸塞絞痛、老年人或虛弱的病人所帶有的腸道弛緩、結腸巨大症、潰瘍性結腸炎、重症肌無力、尿道阻塞、心臟血管不適引起的急性出血。

**警語：**在高溫度之環境下使用，因為會減少出汗的現象，所以會引起熱疲勞感，患者因迴腸造口術或結腸造口術或腸道阻礙而發生之下痢，不適使用本劑。服用本品可能會引起昏睡、視覺模糊，所以使用期間對於從事冒險工作者、汽車駕駛者等均應特別留神，服用本劑之病患，尤其是兒童及年長者可能發生幻覺症狀。

**懷孕期：**動物實驗顯示無畸胎之不良結果，但臨床上孕婦之安全使用報告乃未確定，所以本品須經醫師指示方可使用。

**注意事項：**年老之患者、自發性神經患者、肝病、腎臟病等均應小心服用。對潰瘍性結腸炎之病患者給予大量之Ditropan，也許會發生痙攣性腸塞絞痛或結腸巨大症。

甲狀腺機能亢進者、冠狀動脈心臟病者、充血性心臟衰弱者、心律不整者、心搏過速、血壓過高者、前列腺肥大者，都會因使用本品而加重其症狀。

**副作用：**偶有口乾、出汗減少、尿量停留、視力模糊、心搏加速等現象，請繼續安心服用，數日後這些現象自然會消失。

**用法用量：**成人：通常每天2-3次，每次1-2粒，一天內不超過20mg為宜。

小孩：通常每天2次，每次1粒，一天內不超過15mg為宜。

**賦形劑：**Lactose Monohydrate、Microcrystalline Cellulose、Tartrazine、Calcium Stearate、Corn Starch。

**儲存：**25°C以下陰涼乾燥處。

**包裝：**4-1000粒瓶裝、鋁箔盒裝。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第030803號 GMP G-0961

**藥商：**寶齡富錦生技股份有限公司

**地址：**台北市南港區園區街3號16樓

**製造廠：**寶齡富錦生技股份有限公司平鎮廠

**廠址：**桃園市平鎮區興隆路266號

DP-159A01IN00