

“南光” 撲炎喜 腸溶膜衣錠

Broen-C Enteric F.C. Tablets "N.K."

□成分：Each Tab. contains:

Bromelain.....20000units
L-Cysteine.....20mg

□作用特徵：

1. 具有強力抗炎效果:撲炎喜經口投與由腸管吸收後，迅速地使不活性的Plasminogen變成能使Fibrin分解的Plasmin,故可消除因Fibrin的積聚所產生的體液循環障礙而引起的浮腫、腫脹、疼痛及發赤等現象，另一方面能使血清產生Protease的抑制因子，以抑制Protease的過度活性，消除因Polypeptide積聚所引起之炎症現象。
2. 不影響血液的凝固時間:撲炎喜對於引起炎症的Fibrin具有選擇性的溶解效果，而對於血液凝固所必須的Fibrinogen沒有作用，故不影響血液的凝固時間。
3. 分解壞死細胞，促進組織新生，縮短治療時間:能將壞死細胞分解而淨化病巢面之變性物，使淋巴液再吸收，正化細胞之代謝作用，故可助長組織新生，促進治癒速度。
4. 具有溶痰及化膿作用:對濃密的膠粘分泌物溶解，並泡化，使痰容易咯出，減輕咳嗽，改善肺部換氣，並使膿容易排出。
5. 不會引起過敏症狀:本劑係經口投與，故不致引起血液、凝固、血壓下降、呼吸困難等副作用。
6. 服用簡便，安全投與量增減容易，且不為胃分解而影響藥效。

□適應症：

手術後及外傷後腫脹之緩解、副鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器疾患隨伴咯痰咯出困難、氣管內麻醉後之咯痰咯出困難、痔核。

□用法用量：

1日3-6錠，3-4回分服，依年齡及症狀增減。本藥須由醫師處方使用。

□注意事項：

1. 遇有消化器官潰瘍，重症的肝、腎機能障礙或血液凝固機能不全時，不可使用本劑。
2. 伴有感染症者宜併用適當抗生素或化學療法劑。
3. 本劑宜吞服，不可嚼碎。

□包裝：6-1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

□儲存：請於室溫 25°C 以下陰涼處貯存。

□許可字號：衛署藥製字第 039239 號



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL:886-6-5984121 (代表) FAX:886-6-5981845

2620000000141

“南光” 撲炎喜 腸溶膜衣錠

Broen-C Enteric F.C. Tablets "N.K."

□成分：Each Tab. contains:

Bromelain.....20000units
L-Cysteine.....20mg

□作用特徵：

1. 具有強力抗炎效果:撲炎喜經口投與由腸管吸收後，迅速地使不活性的Plasminogen變成能使Fibrin分解的Plasmin,故可消除因Fibrin的積聚所產生的體液循環障礙而引起的浮腫、腫脹、疼痛及發赤等現象，另一方面能使血清產生Protease的抑制因子，以抑制Protease的過度活性，消除因Polypeptide積聚所引起之炎症現象。
2. 不影響血液的凝固時間:撲炎喜對於引起炎症的Fibrin具有選擇性的溶解效果，而對於血液凝固所必須的Fibrinogen沒有作用，故不影響血液的凝固時間。
3. 分解壞死細胞，促進組織新生，縮短治療時間:能將壞死細胞分解而淨化病巢面之變性物，使淋巴液再吸收，正化細胞之代謝作用，故可助長組織新生，促進治癒速度。
4. 具有溶痰及化膿作用:對濃密的膠粘分泌物溶解，並泡化，使痰容易咯出，減輕咳嗽，改善肺部換氣，並使膿容易排出。
5. 不會引起過敏症狀:本劑係經口投與，故不致引起血液、凝固、血壓下降、呼吸困難等副作用。
6. 服用簡便，安全投與量增減容易，且不為胃分解而影響藥效。

□適應症：

手術後及外傷後腫脹之緩解、副鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器疾患隨伴咯痰咯出困難、氣管內麻醉後之咯痰咯出困難、痔核。

□用法用量：

1日3-6錠，3-4回分服，依年齡及症狀增減。本藥須由醫師處方使用。

□注意事項：

1. 遇有消化器官潰瘍，重症的肝、腎機能障礙或血液凝固機能不全時，不可使用本劑。
2. 伴有感染症者宜併用適當抗生素或化學療法劑。
3. 本劑宜吞服，不可嚼碎。

□包裝：6-1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

□儲存：請於室溫 25°C 以下陰涼處貯存。

□許可字號：衛署藥製字第 039239 號



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL:886-6-5984121 (代表) FAX:886-6-5981845

2620000000141