

抗不整脈劑

“華盛頓” 華尼丁 200公絲膠囊 (硫酸奎尼丁) Wanidine Capsules 200mg “Washington” (Quinidine Sulfate)

- 【說明】：(1) 本劑為直接作用，使心筋之興奮性降低，不應期延長，心筋之自動性降低，而減弱異所性刺激之發生。
(2) 抑制心房節，心室節刺激之傳導。
(3) 直接作用於抑制房室結節之傳導。而同時間接抑制迷走神經之作用，以增強改善房室之傳導。

【成份】：Each capsule contains：

Quinidine Sulfate..... 200mg

【適應症】：心房或心室性早期收縮、陣發性上心室或心室性心搏過速、心房搏動、陣發性心房纖維顫動。心房纖維顫動或心房撲動之電擊轉換後正常心律之維持治療。

【用法用量】：原則上住院患者使用之。本藥須由醫師處方使用。

- (1) 試驗投與：起先以一次量100~200mg口服，副作用發現即停藥。
- (2) 漸增法：對成人之慢性心房細動，最初一天三次，一次200mg，無效時每隔兩天一次量增為400、600mg，給藥次數每隔1~2天增為4、5、6次
- (3) 大量投與：對成人慢性心房細動一次400mg，一天5次連用三天無效即停藥。
- (4) 維持量：成人一天量200~600mg，分1~3次服用。

- 【注意事項】：1. 經常注意觀察患者之脈搏、血壓並定期作心電圖之檢查。
2. 禁忌：(1) 刺激傳導障害之患者。
(2) 嚴重之血性心不全之患者。
(3) 以往對本劑有過敏現象之患者。
(4) 對於高度心臟房室傳導阻斷而無人工調頻裝置之病人禁忌使用。
3. 慎重投與：(1) 血性心不全之患者。
(2) 嚴重肝、腎機能障害之患者。
4. 副作用：血壓下降、發疹、發熱、頭痛、視力障礙、食慾不振。
5. 遮光保存。

包裝：6~1000粒瓶裝

衛署藥製字第 G-2321 號
034003

華盛頓製藥廠股份有限公司
高雄市仁武區工業二路12號

07-3711471

