

氮補膜衣錠
Keamine film coated tablets
衛部藥輸字第 027257 號



【成分】每錠含有	
Calcium-3-methyl-2-oxo-valerate	67.00mg
Calcium-4-methyl-2-oxo-valerate	101.00mg
Calcium-2-oxo-3-phenyl-propionate	68.00mg
Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate	86.00mg
Calcium-DL-2-hydroxy-4-(methylthio) butyrate	59.00mg
L-lysine acetate	105.00mg
L-threonine	53.00mg
L-tryptophan	23.00mg
L-histidine	38.00mg
L-tyrosine	30.00mg

【賦形劑】
內層內容物：Maize starch, Crospovidone, Talc, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Macrogol 6000, Povidone, Ethanol 96%*
膜衣內容物：Eudragit E100, Macrogol 6000, Talc, Quinoline yellow, Triacetin, Titanium dioxide, Isopropyl alcohol*, Purified water*
*不存在最終產品中。

【適應症】
慢性腎不全時胺基酸之補給。

【禁忌症】
高血鈉症、胺基酸代謝紊亂。到目前為止尚無應用於孕婦及幼兒之報告。

【副作用】
偶有高血鈣症。應定期檢查血清鈣含量。應確定給予病患足夠的卡路里。

【相互作用】
含鈣藥品(例如：acetolyte)可能引起血清鈣含量病理性的增加。
由於 Keamine 使尿毒症狀減輕，若有服用氫氧化鋁應減量。注意血清磷酸鹽的減少。為了避免干擾吸收，勿同時投予易和鈣形成複合物的藥物(例如：tetracycline)

【注意事項】
超過有效期限請勿使用，請置於兒童不易取得處。
請同時配合醫師指示，限制每日蛋白質攝取量，以達到效果。

【用法用量】
口服。遵照醫師處方使用。或 70 公斤之成人，一次 4 到 8 錠，一天三次。餐中服用。

【使用時期】
腎絲球過濾率介於 5-25 ml/min，且食物攝取含蛋白質 ≤40g/day(成人)。

【儲存】
超過包裝上標示之使用期限後不應使用。
儲存於 30°C 以下。保持原包裝儲存以防止潮濕。

【包裝】
24-1000 PVDC-Alu 錠鋁箔盒裝
本藥須由醫師處方使用

製造廠：STADA-VN JOINT VENTURE CO., LTD.
廠址：No.40 Tu Do Avenue, Viet Nam-Singapore Industrial park, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam.
藥商：韋淳貿易股份有限公司
地址：台北市松江路 65 號 4 樓
電話：(02)2500-6378