

“晟德”

喘解液

5 微克/毫升

Exdila Liquid

5µg/ml “Center”

GMP
衛署藥製字第 044482 號
G-7556

主 成 分：每毫升(ml)含有
Procaterol Hydrochloride Hemihydrate.....5.0µg

適 應 症：
支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
通常成人：1 回 10 毫升(相當 Procaterol HCl 50µg)，1 日 1 回，睡前服用；或 1 日 2 回，早晨及睡前各服用 10 毫升。
6 歲以上的孩童：1 回 5 毫升(Procaterol HCl 25µg)，1 日 1 回，睡前服用；或 1 日 2 回，早晨及睡前各服用 5 毫升。
未滿 6 歲的孩童：1 回 0.25 毫升/公斤(Procaterol HCl 1.25µg)，1 日 2 回，早晨及睡前各服用 1 回或 1 日 3 回，早、晚睡前各服用 1 回。
得依年齡及症狀適當增減。未滿 6 歲的孩童 1 回標準量如下：
未滿 1 歲：2~3 毫升 (Procaterol HCl 10~15µg)
1~3 歲：3~4 毫升 (Procaterol HCl 15~20µg)
3~6 歲：4~5 毫升 (Procaterol HCl 20~25µg)

特 性：
1. 支氣管擴張作用：
本劑能緩解支氣管痙攣作用，與 Isoproterenol 有同等支氣管擴張的作用，但較 Salbutamol 等強。
2. 支氣管擴張作用時間持續長久：
本劑支氣管擴張時間持續較 Isoproterenol，Salbutamol 長。
3. β₂-感受體選擇性高：
本劑對心血管系無不良影響，對心血管系及氣管的 β₂-感受體的親和力較 Isoproterenol，Salbutamol 優。
4. 抗過敏作用：
本劑對誘發氣喘的游離組織胺(Histamine)有強力的抑制作用。
5. 對氣管的分泌作用：
本劑能促進氣管內纖毛亢進作用，而顯著的影響氣管分泌作用。

注意事項：
1. 甲狀腺機能亢進、高血壓、心疾患、糖尿病患者、孕婦宜慎重投與本劑。
2. 偶有心悸亢進、顏面潮紅、耳鳴、頭痛、胃部不適、口渴、全身倦怠、皮疹等現象。
3. 本劑與 Epinephrine，Isoproterenol，Catecholamine 併用引起不整脈，應避免併用。
4. 本劑對 Allergen 引起的皮膚反應有抑制作用，欲實施皮膚試驗時，須在 12 小時前停藥。

賦 形 劑：Sucrose, Benzoic Acid, Alcohol, Sodium Citrate, Edetate Disodium, Grapefruit Flavour, Water Purified

包 裝：20~4000 毫升塑膠瓶裝

儲 存：
(1)本品應置於兒童不及之處。
(2)請密封避光儲存於 25°C 以下，請勿冰存。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)
CENTER LABORATORIES INC.
地 址： 臺北市南港區園區街 3 之 2 號 7 樓
晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)
廠 址： 新竹縣湖口鄉實踐路 2 號
公司電話： (02) 2655-8680 圖文傳真： (02) 2655-8380
工廠電話： (03) 598-1829 圖文傳真： (03) 598-1820
CTRA-038 20150728

14E01-D01