

濕疹、牛皮癬、皮膚疾患治療劑  
“羅得” 可得舒 乳膏 0.5公絲/公克  
(可洛貝他索)

**CLOTASOL Cream**

0.5mg/gm "R.T" (Clobetasol)

衛署藥製字第031446號

GMP G-1290

可得舒乳膏係局部使用腎上腺皮質類固醇製劑，經臨床使用證明對皮膚疾患療效優異，尤其治療濕疹、牛皮癬更具顯著效果，對其它類固醇製劑無效時，本劑可發揮滿意療效。

【成份】每Gm中含有：

Clobetasol Propionate.....0.5mg

【賦形劑】 Beeswax white; Paraffin; Glyceryl monostearate; Stearyl alcohol; Lanolin anhydrous; Propylparaben; Cetyl isooctanoate; Isopropyl myristate; Liquid paraffin; Polysorbate 60; Methylparaben; Water purified; Stearic acid; Dvna 6391; Lycopsis 2472; Propylene glycol.

【適應症】 牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

【用法用量】 每日一至數回，塗擦於患部，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】 1. 一般注意：

- (1) 濕疹、皮膚炎伴隨之皮膚感染，原則上不使用本品，必須使用時應考慮適當之抗菌劑。
- (2) 由於曾發現皮膚萎縮，副腎皮質性潮紅等局部副作用，因此用於顏面、頭、陰部等部位，應考慮適應症及症狀程度。
- (3) 大量長期廣泛使用時，可能出現副腎皮質素全身投與之症狀，因此應避免之。

2. 禁忌：

- (1) 細菌、真菌、濾過性病毒皮膚感染。
- (2) 對本劑曾有過敏反應之患者。
- (3) 皮膚潰瘍。

3. 副作用：

- (1) 長期使用時可能出現類固醇長期使用之症狀：瘰癧、皮膚炎、口周皮膚炎、皮膚萎縮、微血管擴張、魚鱗癬樣皮膚變化、多毛及色素脫失，出現這些症狀時應減少使用次數，代以不含副腎皮質素之藥品。
- (2) 出現紅斑等過敏症狀時，停藥即可。
- (3) 長期大量廣範圍使用時，應注意腦下垂體副腎皮質系統機能之抑制。

4. 孕婦使用：由於動物實驗有催畸形作用的報告，懷孕及可能懷孕之婦女避免使用。

5. 本劑使用於幼兒時避免長期大量使用，以免妨礙發育。

6. 本劑不得使用於眼科。

【貯存方法】 置於陰涼之處，避免陽光照射。

【包裝】 1000gm以下軟管、罐裝。

**羅得化學製藥股份有限公司**

台中市大甲區東西七路一段65號