用藥指導單張

衛教小組

學　名：Phytomenadione

商品名：KATIMIN 1 INJ 10MG

中文名：嘉體民注射液



一、此藥品的用途是什麼？

低凝血酶元血症。新生兒之出血症狀，手術時之過多出血之預防及治療，維生素K 吸收之障礙及缺乏維生素K 所引起之諸症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 預防及控制新生兒出血：　一出生即肌肉注射1~2mg，必要時可增加。
2. 預防新生兒低凝血酶元血症：預期分娩1 至2 星期前對母體每天肌肉注射10mg，或必要時於分娩開始慢慢靜脈注射1~2mg。
3. 抗凝血藥之拮抗：為回復過低凝血酶元水準，開始時肌肉注射5~10mg，如有必要可增加到20mg。
4. 控制出血：嚴重場合慢慢靜脈注射10~15mg(每分鐘不得超過1mg)。
5. 外科手術時預防低凝血酶元引起之流血過多：手術前每天肌肉注射25~50mg （在任一注射部位不要超過25mg)。
6. 大量流血連帶低凝血酶元血症：嚴重場合慢慢靜脈注射10~15mg(每分鐘不得超過1mg)。
7. 其他原因引起之低凝血酶元血症：2~20mg 其用量與用法視情況而定。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於冷暗處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21