

用藥指導單張

衛教小組 DB6040101

學名：Budesonide 160mcg, Formoterol 4.5mcg

商品名：SYMBICORT (粉狀吸入) TURBUHALER 120 DOSE

中文名：吸必擴都保定量粉狀吸入劑



一、此藥品的用途是什麼？

適合使用類固醇及長效BETA2作用劑 (BETA2-AGONIST) 合併治療的支氣管氣喘 (BRONCHIAL ASTHMA) 。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

推薦劑量：成人及青少年(12歲及以上)：1.Symbicort Turbuhaler 80 / 4.5ug / 劑，每天2次，每次吸入1-2劑。2.Symbicort Turbuhaler 160 / 4.5ug / 劑，每天2次，每次吸入1-2劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 目前之資料尚未確定是否可用Symbicort Turbuhaler來治療氣喘急性之發作。應告知病人隨身攜帶救急之藥物。在症狀惡化期間，不宜啟用本品治療。
2. 如同其他吸入療法一樣，應考量其有可能引起逆理性支氣管痙攣的症狀(paradoxical bronchospasm)，在給藥後立即有哮喘增加之現象。治療應進行再評估，必要時更換目前所用之治療藥物。
3. 任何吸入性類固醇製劑均有可能引起全身性之反應，尤其在高劑量長期使用之下。但吸入性治療發生這些反應之機會，遠比口服類固醇製劑為小。可能之全身性反應，包括腎上腺抑制、兒童及青少年之生長遲滯、骨骼礦物質密度降低、白內障及青光眼。因此，將吸入性類固醇之劑量，調整至可以控制症狀之最低維持劑量，是件非常重要的事。
4. 無論以何種方式給予兒童及青少年類固醇製劑，醫師均應嚴密追蹤其生長現象，並就類固醇治療之必要性及可能引起之生長遲滯之危險性之間，衡量其利弊得失。
5. 如果有任何理由推測其先前使用之全身性類固醇治療，與其腎上腺功能受損有關時，此時若要改以Symbicort Turbuhaler來治療時，要特別地小心。
6. 以吸入性budesonide治療的好處，是能降低口服類固醇所需之劑量，但是病人由口服類固醇方式轉移過來時，仍有相當長之時間，處於腎上腺功能受損之危險性。在過去曾需要高劑量緊急類固醇治療之

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB6040101

學名：Budesonide 160mcg, Formoterol 4.5mcg

商品名：SYMBICORT (粉狀吸入) TURBUHALER 120 DOSE

中文名：吸必擴都保定量粉狀吸入劑



患者，亦可能有此種危險性。在急診或各種會產生壓力之環境下，應牢記有發生此種腎上腺功能受損殘留狀況之可能性，並考慮採用適當之類固醇治療。在選擇不同之治療方式時，可能須會診專家，評估其腎上腺功能受損之程度。

7. 為減少口腔咽喉發生念珠菌感染之機率，應教導患者在每次給藥後以水漱口。

8. 應避免與ketoconazole或其他強效之CYP3A4抑制劑合併使用。如果一定得用時，則將會產生交互作用藥物之給藥時間，儘可能錯開久一點。

9. 對患有嚴重心血管疾病(包括肥厚性阻塞性心肌病變、主動脈瓣下狹窄、重度高血壓、血管瘤、缺氧性心臟病、心博過速、心律不整或重度心臟衰竭)、糖尿病、未矯治之低血鉀症、嗜鉻細胞瘤或甲狀腺毒症患者，給予Symbicort Turbuhaler治療時，應特別小心觀察。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 常見：(>1 / 100) 中樞神經系統：頭痛；心臟血管系統：心悸；肌肉骨骼系統：顫抖；呼吸道：口咽念珠菌感染、喉嚨輕微刺激、咳嗽、嘶啞。

2. 少見：心臟血管系統：心搏過速；肌肉骨骼系統：肌肉痙攣；中樞神經系統：激動、不安、神經質、噁心、暈眩、睡眠障礙。

3. 罕見(<1 / 100) 皮膚：皮疹、蕁麻疹、皮膚癢；呼吸道：支氣管痙攣。在極少數之個案報告中，下列本質上可能相當嚴重之不良效應曾被提出：Budesonide：精神症狀如抑鬱、行為障礙(主要為兒童)，全身性糖皮質類固醇效應之病徵及症狀(包括腎上腺功能低下)、立即型或延遲型過敏性反應(包括皮膚炎、血管神經性水腫及支氣管痙攣)、瘀傷。

4. Formoterol：心絞痛、高血糖症、味覺改變、血壓變動。

5. 如同其他吸入療法一樣，有極少數之病人會發生逆理性之支氣管

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB6040101

學名：Budesonide 160mcg, Formoterol 4.5mcg

商品名：SYMBICORT (粉狀吸入) TURBUHALER 120 DOSE

中文名：吸必擴都保定量粉狀吸入劑



痙攣 (paradoxical bronchospasm)。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師