

用藥指導單張

衛教小組 DQ11810101

學名：Azacitidine

商品名：ANDASON ★100MG (健保事審)

中文名：好佑定凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 治療骨髓增生不良症候群高危險性的病患High Risk MDS：頑固性貧血併有過量芽細胞 (RA with excess blasts, RAEB)、轉變中的頑固性貧血併有過量芽細胞 (RAEB in transformation, RAEB-T)、及慢性骨髓單核細胞性白血病 (chronic myelomonocytic leukemia, CMML)。

2. Azacitidine適用於治療65歲(含)以上、不適合接受HSCT或密集化學治療、且骨髓芽細胞比例>30%的AML成人患者(依據WHO分類)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 第一個治療週期的建議起始劑量為連續7天每天皮下注射一次 75mg/m²體表面積，然後休息21天(共28天治療週期)。
2. 建議至少要治療6個週期，只要患者仍可獲得治療效益即應持續治療，或是持續治療至出現疾病惡化的現象為止。

用法

皮下投予

應輪換使用不同的注射部位(上臂、大腿或腹部)。新的注射位置與先前的注射位置應相距至少2.5公分，且切勿注入有觸痛、瘀傷、發紅或變硬現象的區域。

靜脈投予

用於靜脈投予，應在10~40分鐘內投予所有劑量。且必須在 azacitidine 調配後60分鐘內完成投予。

三、使用時我該注意的特別事項？

貧血、嗜中性白血球減少症及血小板減少症

Azacitidine治療與貧血、嗜中性白血球減少症及血小板減少症有關。應視情況進行全血血球計數，以監測反應及毒性，但每次療程前至少要檢測一次。在給予第一次療程之建議劑量後，後續療程的劑量，應根據用法用量所述最低計數及血液學反應，予以減量或延後療程。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ11810101

學名：Azacitidine

商品名：ANDASON ★100MG (健保事審)

中文名：好佑定凍晶注射劑



D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

血小板減少症、嗜中性白血球減少症與白血球減少症、胃腸道事件(包括噁心、嘔吐)、注射部位反應(包括發燒)。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. Andason 僅供單次使用，並且不含任何防腐劑。剩餘藥液應以適當的方式丟棄。
2. 未調配的注射瓶儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師