用藥指導單張

衛教小組

學　名：Glucose 25mg, NaCl 4.5mg/ml

商品名：DEXTROSE 2.5%,SODIUM CHLORIDE 0.45%500ML(非藥局發

中文名：葡萄糖2.5%食鹽水0.45%注射液



一、此藥品的用途是什麼？

一般水份不足症、血壓之回復調整、低氯性鹼中毒。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
靜脈注射或皮下灌注。用量視病人情況及需要量而定，通常一回100ml~1000ml。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 添加藥物可能引起配伍禁忌。
2. 請勿與血液同時使用。
3. 藥液若非澄清時，請勿使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

如有類似過敏之反應，應即刻停止使用，並給予適當處置。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所，如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19