用藥指導單張

衛教小組 DA6820201

學　名：Norepinephrine

商品名：NOREPINEPHRINE ★ 4MG/4ML/AMP

中文名：諾比奈芬注射液



一、此藥品的用途是什麼？

急性低血壓、心跳停止。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Norepinephrine bitartrate注射液是一種強效性的濃縮藥物，輸注前先用含葡萄糖溶液稀釋，本品應注射於大靜脈。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 避免高血壓：

因為本品之效力及個人對血壓升高劑的反應不等，本品使用過量可能會產生危險性的高血壓，因此最好從開始用藥時每2分鐘記錄一次血壓，直至獲得需要的血壓，如若仍需持續用藥則每5分鐘測一次血壓。注射本品時，要經常注意流速，且病患不可沒人照顧。頭痛可能是劑量過高產生高血壓之症狀。

2. 注射部位：

本品儘可能注射於大靜脈，特別是肘前靜脈，注射於此靜脈因為長時間的血管收縮而造成上層皮膚壞死的危險極少。

3. 溢出：

要隨時檢查注射部位之血流是否流暢，小心避免本品溢出到組織中，因血管收縮作用會使局部組織壞死。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

心臟血管系統：血壓上升與心律不整可能造成反射性心率減慢。

神經系統：焦慮、短暫性的頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

30℃ 以下避光貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital