用藥指導單張

衛教小組 DA4410201

學　名：Nitroglycerin

商品名：NITROSTAT 0.6MG

中文名：耐絞寧錠



一、此藥品的用途是什麼？

狹心症之治療及預防。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
當急性心絞痛第一徵象發作時，迅速將一粒耐絞寧錠至於舌下或口腔頰中，使其溶化吸收。在症狀緩解前，每隔五分鐘重複服用一粒。若在15分鐘內服用3粒後仍舊疼痛則應立即就醫。Nitrostat 作為預防使用時，則在從事可能引起心絞痛發作的活動前5-10分鐘服用。

急性心絞痛發作時，最好休息並採取坐姿服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 以最低有效量來緩解心絞痛之發作，切忌以大量至耐增加。
2. 本品由口腔及舌下服用，不可咬碎，切記勿吞服，如發生視力模糊或口乾現象即須停藥。
3. 過量投與Nitroglycerin會引起嚴重頭痛，不可與Viagra併用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

服用本品後暫時性頭痛可能會立即發生，以及眩暈、虛弱、蒼白，心跳過快，明顯起立性低血壓，偶而會發生，尤其對一些直立不動病人。小部份報告亦顯示由硝基引起暈厥，酒精會引起腦部局部缺血症狀加劇。

六、此藥儲存時的條件為何？

舌下錠貯臟條件:避濕。置於原包裝瓶內室温儲存，並避免潮濕，一般在開封6個月後，未用完的藥品要丟棄。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06