用藥指導單張

衛教小組 DA3630301

學　名：Amlodipine+Olmesartan medoxomil

商品名：sevikar 5/20mg(紅)(低劑量)

中文名：舒脈康膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.一般考慮事項

Olmesartan medoxomil通常很少產生副作用，且副作用顯然與劑量無關，但amlodipine的副作用（主要是水腫）則與劑量有關。改變劑量後2週內可達到最大降血壓效果。 Sevikar 可搭配或不搭配食物服用。 Sevikar可與其他降血壓藥物併用。使用2週後可增加劑量。Sevikar的最高建議劑量是10/40mg。

2.替代治療

Sevikar可以取代其個別的成份。取代個別成份時，若血壓控制仍不理想，可提高其中一種或兩種成份的劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

不良反應通常與其個別成分有關。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

水腫、頭暈。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25℃ 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03