
用藥指導單張

衛教小組 DA8790201

學　名：DOPAMIN 40MG/ML 5ML

商品名：DOPAMIN★ INJ 200MG 5ML

中文名：得保命注射液



一、此藥品的用途是什麼？

休克症候群及心臟衰竭。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
本品不得直接皮下，肌肉或直接靜脈注射。需以5%葡萄糖液或生理食鹽水稀釋後靜脈點滴靜注。初劑量速率為每分鐘2～5μg/kg，而後視病人之血壓，心輸出量，尿量而漸增速率每分鐘1～10μg/kg遇嚴重之病情，若需要時可增至每分鐘速率20～50μg/kg(最多為50μg)。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、心悸、心跳過速、稍低血壓、中等程度的呼吸困難。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.16