

用藥指導單張

衛教小組

學名：Alogliptin+Pioglitazone

商品名：OSENi 25MG/30MG

中文名：歐欣尼膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

Oseni (alogliptin+ pioglitazone)可用於以下狀況之成年第二型糖尿病治療：

1. 使用alogliptin 單方每25mg或pioglitazone單方每日30 mg 治療仍控制血糖不佳者。
2. 與metformin 併用，本品適用於已使用alogliptin每日25 mg 加上metformin(使用劑量 $\geq$ 每日1500 mg或已達最高耐受劑量)治療仍控制血糖不佳者、或已使用pioglitazone 每日15或30mg 加上metformin(使用劑量 $\geq$ 全每日1500 mg 或已達最高耐受劑量)治療仍控制血糖不佳者。
3. 已使用alogliptin 以及pioglitazone 控制良好的患者，可與本藥品互換使用。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 不建議本藥品不同劑量組合的轉換或合併使用，且不能以2錠12.5mg/15mg 做為1錠25mg/30mg。
2. 使用 Oseni應每日一次，隨餐或空腹後服用。必須整錠吞服，不可剝開。
3. Oseni的建議劑量 (alogliptin與pioglitazone)為：
 - (1) 已使用 alogliptin 單方每日25mg治療，仍需控制血糖的患者，劑量為25mg/15mg或25mg/30mg。
 - (2) 已使用 pioglitazone 每日30mg 單方治療，仍需控制血糖的患者，劑量為25mg/30mg。
 - (3) 已使用 alogliptin每日25mg加上metformin(使用劑量 $\geq$ 每日1500mg或已達最高耐受劑量)治療，仍需控制血糖的患者，可使用metformin合併Oseni 25mg/15mg或25mg/30mg。
 - (4) 已使用pioglitazone每日15mg加上metformin (使用劑量 $\geq$ 每日1500mg 或已達最高耐受劑量)治療，仍需控制血糖的患者，可使用 metformin 合併Oseni

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組

學名：Alogliptin+Pioglitazone

商品名：OSENi 25MG/30MG

中文名：歐欣尼膜衣錠



25mg/15mg。

(5) 已使用 pioglitazone 每日 30mg 加上 metformin (使用劑量 $\geq$ 每日 1500mg 或已達最高耐受劑量) 治療，仍需控制血糖的患者，可使用 metformin 合併 Oseni 25mg/30mg。

(6) 併用 alogliptin 與 pioglitazone 而改用 Oseni 的患者，依目前 alogliptin 與 pioglitazone 的劑量施用。

4. 可根據血紅素 A1c 所顯示的血糖反應，調整 Oseni 劑量，最高為每日一次 25mg/30 mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

鼻咽炎、背痛、上呼吸道感染、低血糖。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 25° C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師