

用藥指導單張

衛教小組 DQ0540101

學名：Pazopanib

商品名：VOTRIENT ★ FILM-COATED 200MG (健保事審)

中文名：福退癌膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

晚期腎細胞癌之第一線治療，或用於已接受細胞激素(cytokine)治療失敗之晚期腎細胞癌患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

VOTRIENT之建議劑量為一天一次，空腹時口服800 mg（至少於用餐前1小時或用餐後2小時。VOTRIENT 之劑量不應超過 800 mg。

請勿壓碎藥錠，因為可能會增加吸收速率而影響全身暴露量。

當漏服一劑時，如果與下次服藥時間的間隔小於12個小時，請勿補服。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

VOTRIENT可能出現的嚴重不良反應包含：肝毒性、QT延長、Torsades de pointes(一種多型性心室心律不整)、出血事件、動脈血栓事件、胃腸道穿孔及瘻管。

六、此藥儲存時的條件為何？

請勿存於超過30° C處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師