用藥指導單張

衛教小組 DQ12500101

學　名：Trastuzumab deruxtecan

商品名：ENHERTU ★ 100MG FOR INFUSION(健保事審)

中文名：優赫得凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

單獨使用適用於治療轉移後曾接受過兩種以上抗 HER2 療程、具有無法切除或轉移性 HER2 陽性乳癌的成人病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
初次給藥應以 90 分鐘靜脈輸注施用。若前次輸注耐受良好，後續的 ENHERTU 劑量可以 30 分鐘輸注施用。

劑量

ENHERTU 的建議劑量為 5.4mg/kg，每 3 週以靜脈輸注給藥(21 天週期)，直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止。

施用方式

ENHERTU 供靜脈輸注使用。

必須由專業醫療人員進行配製與稀釋，並以靜脈輸注施用。

ENHERTU 不可採取靜脈推注(push)或快速灌注(bolus)的方式施用。

三、使用時我該注意的特別事項？

不預期ENHERTU會影響病人駕駛或操作機器的能力。由於有發生如疲倦、頭痛與眩暈等不良反應的潛在可能，應指示病人在駕駛或操作機器時格外小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、疲倦、嘔吐、掉髮、便秘、食慾減退、貧血、嗜中性白血球減少症、腹瀉、血小板 減少症、咳嗽、白血球減少症與頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

配製好的溶液

建議立即使用配製好的溶液，如未立即使用，配製後的溶液，避光儲存於 2° C至 8° C冰箱最多 24小時。

稀釋後的溶液

建議立即使用稀釋後的溶液。如未立即使用，稀釋後的溶液，避光儲

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

用藥指導單張

衛教小組 DQ12500101

學　名：Trastuzumab deruxtecan

商品名：ENHERTU ★ 100MG FOR INFUSION(健保事審)

中文名：優赫得凍晶注射劑



存在室溫(≦30℃)最多 4小時，或儲存於 2° C至 8° C冰箱最多 24小時。儲存時間自配製時間起算。

特殊儲存注意事項

配製前，儲存於冰箱(2° C - 8° C)。不得冷凍。本藥品不含防腐劑，僅供單次使用。 請丟棄藥瓶中的殘劑。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11