

用藥指導單張

衛教小組 DC3170101

學名：Clonazepam

商品名：CLONOPAM 0.5MG (管藥四)

中文名：克癇平錠



一、此藥品的用途是什麼？

癲癇。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

口服治療：為避免開始治療的不良反應，必須慢慢增加每日劑量至適合各個病人之維持劑量。嬰兒和10歲以下孩童（或體重30 Kg 以下）的起始劑量為每日0.01 ~ 0.03 mg/Kg，10歲以上孩童（或體重超過30 Kg）的建議起始劑量為每日1 ~ 2 mg。維持劑量在嬰兒和10歲以下孩童（或體重30 Kg 以下）為每日0.05 ~ 0.1 mg/Kg，10 ~ 16歲孩童（或體重超過30 Kg）為每日1.5 ~ 3 mg，成人則建議每日2 ~ 4 mg。一旦達到維持劑量的程度，每日量可於晚上給予單一劑量。如劑量必須分開幾次，最大劑量應在晚上給予。維持劑量最好在治療1 ~ 3星期後達到。為確保最理想的劑量調整，嬰兒應給予滴劑而孩童給予0.5 mg 錠劑。為方便成人在開始治療時，服用較低的每日劑量，應給予0.5 mg 錠劑。

成人最大治療劑量為每日20 mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

Benzodiazepines 用於有酒精或藥物濫用史的病人，應非常小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

疲倦、白天昏昏欲睡、倦怠（lassitude）、肌張力過低、肌肉無力、暈眩、頭昏眼花、運動失調、反應遲緩。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25°C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師