
用藥指導單張

衛教小組 DJ9270501

學　名：Influenza, inactivated, whole virus

商品名：VAXIGRIP 0.5ML(幼兒6個月到3歲)(公費)

中文名：菲流達三價流感疫苗



一、此藥品的用途是什麼？

適用於6個月以上兒童、青少年及成人之主動免疫接種，以預防此疫苗所涵蓋之A型與B型流感病毒所引起的流感。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人：

0.5毫升一劑。

6個月至17歲兒童和青少年

曾接種過流感疫苗之兒童，或9歲以上的兒童和青少年：0.5毫升一劑。年齡未滿9歲且先前未曾接種過流感疫苗的兒童：應至少間隔4週後，再接種第2劑0.5毫升疫苗。

年齡小於6個月的嬰兒：接種Vaxigrip (主動免疫接種)的安全性及療效尚未建立。目前無可提供之資料。

接種方式

本疫苗應以肌肉注射或皮下深層注射方式接種。

肌肉注射的首選部位：6至35個月兒童為大腿的前外側(或若肌肉質量足夠則可注射於三角肌)；而36個月以上的兒童及成人則以三角肌為首選。

三、使用時我該注意的特別事項？

警語

若病人有中度或重度發燒或急性病症時，則疫苗宜延後接種。
Vaxigrip在任何情況下，皆不可經由血管給藥。

如同其他肌肉接種的疫苗一樣，對於有血小板減少症或出血性疾病者，接種疫苗時應小心，因為這些人在肌肉接種後有可能會發生出血的情形。

昏厥(暈倒)有可能在接種任何疫苗之前或之後發生，這是對針頭注射所產生的一種心理反應，須制訂相關程序以避免因昏倒受傷並處置暈厥反應。 如同接種所有疫苗一樣，接種場所應備妥適當的緊急處理藥物並加以監測，以應付疫苗接種後可能出現的過敏性休克反應。

已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，由熟悉處理過敏症狀之醫護人

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11


用藥指導單張

衛教小組 DJ9270501

學　名：Influenza, inactivated, whole virus

商品名：VAXIGRIP 0.5ML(幼兒6個月到3歲)(公費)

中文名：菲流達三價流感疫苗



員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。

臨床上應在疫苗接種前先評估接種風險：檢視醫療史(特別是先前的接種史及可能發生的不良事件)及臨床檢查。

Vaxigrip適用於針對此疫苗所對抗之流感病毒株提供保護。

如同接種任何疫苗一樣，Vaxigrip有可能無法提供所有接種者完整的保護力。 被動免疫方面，並非所有孕婦接種疫苗後，都能提供有效的保護給6個月以下的嬰兒(見10與12小節)。

若病人有內因性(潛在疾病)或醫源性免疫抑制治療之情況，可能無法產生足夠的抗體反應。

Vaxigrip每劑含少於1 mmol (39毫克)的鉀及鈉(23毫克)，也就是說實質上『無鉀』及『無鈉』。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位疼痛。嚴重度以輕度為主。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於冰箱（2℃-8℃）。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11