

用藥指導單張

衛教小組 DM15810101

學名：Moxifloxacin

商品名：VIGAMOX OPH. SOL 5ML/100drops (自費/向上)

中文名：威爾眸點眼液



一、此藥品的用途是什麼？

治療下列微生物具感受性的菌株所引起的細菌性結膜炎。

好氧性革蘭氏陽性菌：Corynebacterium species*、Micrococcus luteus*、Staphylococcus aureus、Staphylococcus epidermidis、Staphylococcus haemolyticus、Staphylococcus hominis、Staphylococcus warneri*、Streptococcus pneumoniae、Streptococcus viridans group

好氧性革蘭氏陰性菌：Acinetobacter Iwoffii*、Haemophilus influenzae、Haemophilus parainfluenzae*

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

每次點一滴於患眼，每天三次，連續點藥七天。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 一般：和其他抗菌製劑一樣，長期使用可能導致非敏感性微生物（包括黴菌）過度生長。若發生重複感染時，應停藥並採取適當的替代治療方式。當臨床判定有需要時，患者需接受利用放大倍率的輔助工具所進行的檢查，如隙燈活體組織顯微鏡或螢光染色檢查。
2. 應告知患者：若發生感染細菌性結膜炎的症狀時，不要配戴隱形眼鏡。
3. 患者須知：避免瓶口與眼睛、手指及其他地方接觸，以免遭到污染。
4. 全身投予quinolone 類藥品（包括moxifloxacin）可能造成過敏反應，甚至是在第一次給藥後就發生。一出現皮疹或過敏反應的徵狀時，請立即停用並求醫。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM15810101

學名：Moxifloxacin

商品名：VIGAMOX OPH. SOL 5ML/100drops (自費/向上)

中文名：威爾眸點眼液



最常見的眼部副作用為結膜炎、視覺敏銳度降低、眼睛乾澀、角膜炎、眼部不適、眼部充血、眼部疼痛、眼部搔癢、結膜下出血及流淚。這些問題的發生率約為1-6%。

非眼部副作用發生率介於1-4%，有：發燒、咳嗽增加、感染、中耳炎、咽炎、皮疹及鼻炎。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

眼藥水第一次開瓶使用，4星期後，如未用完，剩下的應拋棄。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師