
用藥指導單張

衛教小組 DA6300201

學　名：Amiodarone

商品名：CORDARONE ★150MG/3ML

中文名：臟得樂注射液



一、此藥品的用途是什麼？

短期使用治療心室纖維顫動、WOLFF-PARKINSON-WHITE氏症候群、上室性及心室性心搏過速、心房撲動心房纖維顫動。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

起始劑量 ： 按每公斤體重給予5mg計算，溶解於葡萄糖溶液中。若可能的話，請使用電動注射器，在20分鐘至2小時時間內靜脈輸注給藥，可每24小時重複輸注二至三次。

維持劑量 ： 日劑量一般依體重10-20mg/kg計算(通常600至800mg/24小時，至多1.2g/24小時)，配以250ml葡萄糖溶液輸注數天。

三、使用時我該注意的特別事項？

電解質障礙，特別是低血鉀症:應注意病人是否有和低血鉀症相關聯的電解質障礙，低血鉀症可能會誘發致心律不整效應。

在給予 amiodarone之前應先校正病人之低血鉀症。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

熱潮紅、盜汗、噁心、掉頭髮。

引起中度和短暫性之血壓降低。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03