

用藥指導單張

衛教小組 DA8480301

學名：Epinephrine

商品名：ADRENALIN★ 1mg/1ml/Amp

中文名：安得理那寧注射液



一、此藥品的用途是什麼？

過敏反應引起之休克、呼吸道痙攣或喉頭水腫心跳停止之急救、支氣管性氣喘。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

治療過敏性休克：成人一開始時0.5mg肌注或皮下，以後每隔5～15分鐘靜注0.25～0.5ml:10000溶液。

兒童一肌注0.3mg，需要時每隔15分鐘注射一次；緊急時亦可靜注

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 大量使用可能引起心悸，呼吸困難。
2. 會引起腸損傷使小腸發生阻塞，出血及穿孔。
3. 引起升壓反應如急性肺水腫、不整脈、心跳停，勿過量投與。
4. 靜脈內投與時，為不使血壓異常上升，請小心投與。
5. 在靜脈注射點滴時，大量的注射液漏出於血管外時，會出現局部的虛性壞死。
6. 在局部麻醉劑內添加使用時，請勿投與耳、指趾，或陰莖。
7. 針對肌肉注射時，為避免組織、神經等之影響，請注意如：
 - A. 關於注射部位，避免於神經步行部位，請慎重投與。
 - B. 反覆注射時，對新生兒、早產兒、乳兒、小兒，應特別注意。
 - C. 插入注射針時，拔起針，改換部位注射之。
 - D. 為了避免開啟Ampule時異物的混入，請用Ethanol消毒棉等擦拭乾淨後才開啟。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DA8480301

學名：Epinephrine

商品名：ADRENALIN★ 1mg/1ml/Amp

中文名：安得理那寧注射液



使用本劑如有胸痛、不規則心跳等副作用應與醫療照應。

使用本藥如有下列副作用持續或引起困擾時應與醫療照應：頭痛、神經質、不安、心臟搏動異常快速。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師