

用藥指導單張

衛教小組 DL10090201

學名：Aripiprazole
商品名：ARIZOLE 10MG
中文名：羅亞達錠



一、此藥品的用途是什麼？

成人和青少年(13至17歲)的思覺失調症。成人和兒童(10至17歲)的雙極性疾患之躁症發作及混合型發作，可單獨使用或做為鋰鹽或Valproate的輔助治療。第一型雙極性疾患維持治療之鋰鹽或valproate的輔助治療。重鬱症之輔助治療。兒童(6至17歲)的自閉性疾患伴隨之急躁易怒。妥瑞氏症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

思覺失調症

成人：

建議起始劑量與目標劑量為每日10或15mg，一日一次，不須考慮飲食因素。

青少年：

建議目標劑量為10mg/日。

雙極性疾患

躁症發作及混合型發作之急性治療

成人：Aripiprazole單一藥物療法的建議起始劑量為15毫克/日，一日一次，而做為鋰鹽或valproate的輔助治療的建議起始劑量為10-15毫克/日，一日一次，不須考慮飲食因素。建議的目標劑量為15毫克/日，可做為單一藥物治療或做為鋰鹽或valproate的輔助治療。劑量可依臨床反應提高至30毫克/日。30毫克/日以上之劑量的安全性尚未在臨床試驗評估過[參見臨床研究]。

兒童病人：Aripiprazole做為10至17歲兒童單一藥物治療的建議起始劑量為2毫克/日，並於2天後調整為5毫克/日，再於另外2天之後調整至10毫克/日的目標劑量。Aripiprazole做為鋰鹽或valproate的輔助治療的建議劑量與單一藥物治療相同。如果有需要的話，則後續應以每次增加5毫克的方式提高劑量。使用Aripiprazole時，並不須考慮飲食因素。

重鬱症之輔助治療

成人一使用Aripiprazole做為已使用抗憂鬱劑治療之病人的輔助治療用藥時，建議起始劑量為2毫克/日至5毫克/日。建議劑量範圍是2毫克/日至15毫克/日。應以每次不超過5毫克/日的方式逐步調整劑量，且間隔不可少於1週[參見臨床研究]。病人應定期接受重新評估，以確認維持治療的必要性。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL10090201

學名：Aripiprazole
商品名：ARIZOLE 10MG
中文名：羅亞達錠



自閉性疾患伴隨之急躁易怒

兒童病人(6~17歲)一兒童自閉性疾患伴隨之急躁易怒之建議劑量範圍為5毫克/日至15毫克/日。

Aripiprazole的起始劑量為每日劑量2毫克，如果需要，每日劑量增加至5毫克，接著再增加至10毫克/日或15毫克/日。應以每次不超過5毫克/日的方式逐步調整劑量，且間隔不可少於1週[參見臨床研究]。病人應定期接受重新評估，以確認維持治療的必要性。

妥瑞氏症

兒童病人(6~18歲)

妥瑞氏症之建議劑量範圍為5毫克/日至20毫克/日。

對於體重小於50公斤的病人，起始劑量為每日2毫克，並在2天後達到目標劑量5毫克/日。在抽動(tics)未獲理想控制的病人，可增加劑量至10毫克/日。應以每次不超過5毫克/日的方式逐步調整劑量，且間隔不可少於1週。

對於體重大於50公斤的病人，起始劑量為每日2毫克，使用2天，之後增加劑量至5毫克/日，使用5天，目標劑量為在第8天時達10毫克/日。在抽動(tics)未獲理想控制的病人，可增加劑量至20毫克/日。應以每次不超過5毫克/日的方式逐步調整劑量，且間隔不可少於1週。

三、使用時我該注意的特別事項？

認知及運動能力受損的可能性

和其它的抗精神病藥物一樣，Aripiprazole也可能會損害判斷、思考或運動的能力。例如，在短期的安慰劑對照試驗中，出現嗜睡（包括鎮靜）現象的通報率如下（Aripiprazole組發生率，安慰劑組發生率）：在使用口服Aripiprazole治療的成人病人（n=2467）中為（11%，6%），在6至17歲的兒童病人（n=611）中為（24%，6%）。在短期的安慰劑對照試驗中，因出現嗜睡（包括鎮靜）現象而導致停藥的病人比例，在使用口服Aripiprazole治療的成人病人中為0.3%（8/2467），在兒童病人（6至18歲）中為3%（20/732）。

雖然這些事件的發生率和安慰劑組相比較的相對升高程度並不大，仍應告誡病人不要操作危險機械（包括汽車），直到他們相當確定使用Aripiprazole治療不會對他們造成不良影響為止。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL10090201

學名：Aripiprazole

商品名：ARIZOLE 10MG

中文名：羅亞達錠



無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

成人最常見的不良反應有噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能、焦慮、失眠及焦躁不安。

兒童最常見的不良反應有嗜睡、頭痛、嘔吐、錐體外徑症狀、疲倦、食慾增加、失眠、噁心、鼻咽炎及體重增加。

六、此藥儲存時的條件為何？

30℃以下貯存及小孩接觸不到之處所。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師