

用藥指導單張

衛教小組 DD13380101

學名：Alginic acid+Aluminum Hydroxide+Magnesium carbonate

商品名：ALGITAB CHEW TAB 200MG(自費)

中文名：艾胃逆服咀嚼錠



一、此藥品的用途是什麼？

逆流性食道炎、裂孔赫尼亞、胃灼熱、胃及十二指腸潰瘍、胃酸過多。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一日服用3次，每次服用2顆。

餐後咀嚼服用，睡前服用效果更佳。

三、使用時我該注意的特別事項？

一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 三歲以下。

2. 消化道潰瘍的人。

3. 腎衰竭病患（長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用）。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射，宜保存於25°C以下。

3. 勿超過建議使用量。

4. 每一錠含鈉 0.4mEq。

5. 本藥應於口中咀嚼或溶化後吞服。

6. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、便秘、噁心、嘔吐、打嗝。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD13380101

學名：Alginic acid+Aluminum Hydroxide+Magnesium carbonate

商品名：ALGITAB CHEW TAB 200MG(自費)

中文名：艾胃逆服咀嚼錠

避免陽光直射，請置於適當陰涼處所(25 C 以下)。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師