用藥指導單張

衛教小組 DM13390101

學　名：Avibactam sodium+Ceftazidime

商品名：ZAVICEFTA 2G/0.5G

中文名：贊飛得注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

適用於治療3個月以上兒童及成人病人對Zavicefta 具感受性的革蘭氏陰性微生物所引起的下列感染：

(1)複雜性腹腔內感染。

(2)複雜性泌尿道感染，包括腎盂腎炎。

(3)院內感染型肺炎，包括呼吸器相關肺炎治療與上列任何感染相關，或疑似與上列任何感染相關之菌血症成人病人。

應考量抗生素的使用準則來合理使用抗生素製劑。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

法

靜脈輸注。

Zavicefta給藥　式為以120分鐘將適當的輸注量以靜脈輸注完畢。

調製　式

必須以注射　　調配粉末，並在稀釋濃縮液後立即使　。調配後的溶液為淺黃　溶液，不含顆粒物質。 Zavicefta (ceftazidime/avibactam)是複　藥品；每　瓶含2 g的ceftazidime和0.5 g的 avibactam，比率固定為4:1。

建議劑量僅根據ceftazidime成分含量　定。

製備及給予溶液時應採　標準無菌操作。可以在適當　　的輸液袋或輸液注射針筒中製備劑量。

注射　藥品應在使　前　視觀察是否有顆粒。

每　　瓶為單次使　。

從開始調配到完成製備靜脈輸注之間所經過的時間總長度不應超過30 分鐘。

三、使用時我該注意的特別事項？

以120分鐘將適當的輸注量以靜脈輸注完畢。

從開始調配到完成製備靜脈輸注之間所經過的時間不應超過30 分鐘。

調配後，每毫升含有ceftazidime 167.3 mg及avibactam 41.8 mg

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26

用藥指導單張

衛教小組 DM13390101

學　名：Avibactam sodium+Ceftazidime

商品名：ZAVICEFTA 2G/0.5G

中文名：贊飛得注射劑



輸注袋或輸液注射針筒之成　和兒童劑量的製備說明：

註：以下程序說明製備最終濃度為 8-40 mg/mL 的 ceftazidime 輸注液的步驟。在開始這些步驟之前，應完成所有計算。對於 3 個到 12 個　的兒童病　，也提供製備 20 mg/mL 濃度（對於　多數情況已經　夠）的詳細步驟。

1. 製備還原液（167.3 mg/mL的 ceftazidime）：

a. 以注射器針頭刺穿　瓶封　並注入 10 mL 注射　無菌　。

b. 抽出針頭並搖晃　瓶以得到澄清溶液。

c.待藥品溶解後，以氣體釋放針插入　瓶封　以釋放內部壓　（這對於保持藥品的無菌性很重要）。

2. 製備輸注　最終溶液（ceftazidime的最終濃度必須為 8-40 mg/mL）：

a.輸注袋：將經適當計算容量的還原液轉移到裝有含有以下任何　種內容物的輸注袋中，以便進　步稀釋還原液：9 mg/mL (0.9%) 的氯化鈉注射液、50 mg/mL (5%) 的葡萄糖注射液或乳酸林格　注射液。

b.輸液注射針筒：經適當計算容量的還原液合併　夠容量稀釋液（9 mg/mL (0.9%) 的氯化鈉注射液或 50 mg/mL (5%) 的葡萄糖注射液）後，將此進　步稀釋的還原液轉移　輸液注射針筒中。

上述在輸注袋或輸液注射針筒中製備劑量請詳見仿單具有在2 - 8° C下保存最長12　時、所有其他ceftazidime濃度（>8mg/mL　40 mg/mL）具有在不超過25° C下保存最長4　時的使　中穩定性。

在輸液注射針筒製備供 3　12 個　兒病　使　之 Zavicefta，因篇幅關係，請詳見仿單。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

25° C下保存。

稀釋

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26

用藥指導單張

衛教小組 DM13390101

學　名：Avibactam sodium+Ceftazidime

商品名：ZAVICEFTA 2G/0.5G

中文名：贊飛得注射劑



後輸注袋如果使　第 3.2 節中列出的稀釋液製備靜脈溶液(ceftazidime 濃度為 8 mg/mL)，在2 - 8° C下保存最長12　時、且隨後在不超過25° C下保存最長4　時的條件下，證實其化學及物理　的使　中穩定性(從最初的　瓶穿刺開始)。

如果使　第 3.2 節中列出的稀釋液製備靜脈溶液(ceftazidime 濃度為 > 8　40mg/mL)，在不超過25° C下保存最長4　時的條件下，證實其化學及物理　的使　中穩定性(從最初的　瓶穿刺開始)。

輸液注射針筒(Infusion syringes)

已確立在不超過 25° C下，使　中化學和物理安定性可長達6　時(從最初的　瓶穿刺開始)。

就微　物學觀點來看，此藥品應立即使　，除非在受控和經過驗證的無菌條件下進　調配和稀釋。若未立即使　，應由使　者負責使　前的保存時間及條件，不應在不超過 25° C下放置超過6　時。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26