

用藥指導單張

衛教小組 DM13390101

學名：Avibactam sodium+Ceftazidime

商品名：ZAVICEFTA 2G/0.5G

中文名：贊飛得注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

適用於治療3個月以上兒童及成人病人對Zavicefta 具感受性的革蘭氏陰性微生物所引起的下列感染：

- (1) 複雜性腹腔內感染。
- (2) 複雜性泌尿道感染，包括腎盂腎炎。
- (3) 院內感染型肺炎，包括呼吸器相關肺炎治療與上列任何感染相關，或疑似與上列任何感染相關之菌血症成人病人。

應考量抗生素的使用準則來合理使用抗生素製劑。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

法

靜脈輸注。

Zavicefta給藥 式為以120分鐘將適當的輸注量以靜脈輸注完畢。

調製 式

必須以注射 調配粉末，並在稀釋濃縮液後立即使 。調配後的溶液為淺黃 溶液，不含顆粒物質。Zavicefta (ceftazidime/avibactam)是複 藥品；每 瓶含2 g的ceftazidime和0.5 g的 avibactam，比率固定為4:1。

建議劑量僅根據ceftazidime成分含量 定。

製備及給予溶液時應採 標準無菌操作。可以在適當 的輸液袋或輸液注射針筒中製備劑量。

注射 藥品應在使 前 視觀察是否有顆粒。

每 瓶為單次使 。

從開始調配到完成製備靜脈輸注之間所經過的時間總長度不應超過30 分鐘。

三、使用時我該注意的特別事項？

以120分鐘將適當的輸注量以靜脈輸注完畢。

從開始調配到完成製備靜脈輸注之間所經過的時間不應超過30 分鐘。

調配後，每毫升含有ceftazidime 167.3 mg及avibactam 41.8 mg

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM13390101

學名：Avibactam sodium+Ceftazidime

商品名：ZAVICEFTA 2G/0.5G

中文名：贊飛得注射劑



輸注袋或輸液注射針筒之成 和兒童劑量的製備說明：

註：以下程序說明製備最終濃度為 8-40 mg/mL 的 ceftazidime 輸注液的步驟。在開始這些步驟之前，應完成所有計算。對於 3 個到 12 個 的兒童病 ，也提供製備 20 mg/mL 濃度（對於 多數情況已經 夠）的詳細步驟。

1. 製備還原液（167.3 mg/mL 的 ceftazidime）：
 - a. 以注射器針頭刺穿 瓶封 並注入 10 mL 注射 無菌 。
 - b. 抽出針頭並搖晃 瓶以得到澄清溶液。
 - c. 待藥品溶解後，以氣體釋放針插入 瓶封 以釋放內部壓 （這對於保持藥品的無菌性很重要）。
 2. 製備輸注 最終溶液（ceftazidime 的最終濃度必須為 8-40 mg/mL）：
 - a. 輸注袋：將經適當計算容量的還原液轉移到裝有以下任何 種內容物的輸注袋中，以便進 一步稀釋還原液：9 mg/mL（0.9%）的氯化鈉注射液、50 mg/mL（5%）的葡萄糖注射液或乳酸林格 注射液。
 - b. 輸液注射針筒：經適當計算容量的還原液合併 夠容量稀釋液（9 mg/mL（0.9%）的氯化鈉注射液或 50 mg/mL（5%）的葡萄糖注射液）後，將此進 一步稀釋的還原液轉移 輸液注射針筒中。
- 上述在輸注袋或輸液注射針筒中製備劑量請詳見仿單具有在 2 - 8° C 下保存最長 12 時、所有其他 ceftazidime 濃度（>8mg/mL 40 mg/mL）具有在不超過 25° C 下保存最長 4 時的使 中穩定性。
- 在輸液注射針筒製備供 3 12 個 兒病 使 之 Zavicefta，因篇幅關係，請詳見仿單。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

25° C 下保存。

稀釋

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM13390101

學名：Avibactam sodium+Ceftazidime

商品名：ZAVICEFTA 2G/0.5G

中文名：贊飛得注射劑



後輸注袋如果使 第 3.2 節中列出的稀釋液製備靜脈溶液 (ceftazidime 濃度為 8 mg/mL)，在 2 - 8° C 下保存最長 12 時、且隨後在不超過 25° C 下保存最長 4 時的條件下，證實其化學及物理的使 中穩定性(從最初的 瓶穿刺開始)。

如果使 第 3.2 節中列出的稀釋液製備靜脈溶液 (ceftazidime 濃度為 > 8 40mg/mL)，在不超過 25° C 下保存最長 4 時的條件下，證實其化學及物理的使 中穩定性(從最初的 瓶穿刺開始)。

輸液注射針筒 (Infusion syringes)

已確立在不超過 25° C 下，使 中化學和物理安定性可長達 6 時(從最初的 瓶穿刺開始)。

就微生物學觀點來看，此藥品應立即使 ，除非在受控和經過驗證的無菌條件下進 調配和稀釋。若未立即使 ，應由使 者負責使 前的保存時間及條件，不應在不超過 25° C 下放置超過 6 時。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師