

# 用藥指導單張

衛教小組 DI7940201

學名：Anti-D (rh) immunoglobulin

商品名：RH-O-GLOBULIN

中文名：抗RH因子球蛋白注射液



## 一、此藥品的用途是什麼？

預防因配偶間 R H 因子不同而導致之流產及初生兒夭折。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

預防新生兒的Rh溶血性疾病，建議在Rho(D)陰性母親生下Rho(D)陽性的胎兒72小時內使用HyperRH0 S/D Full Dose，(12)但必須符合下列標準：

1. 母親必須是Rho(D)陰性、且尚未被Rho(D)因子敏感化。
2. 產下的嬰兒是Rho(D)陽性、且在直接抗球蛋白試驗中必須呈陰性反應。

如果在分娩前使用HyperRH0 S/D Full Dose，母親必須在Rho(D)陽性胎兒出生後再使用一劑。如果確定父親也是Rho(D)陰性，就無須使用HyperRH0 S/D Full Dose。

所有尚未免疫化的Rho(D)陰性母親，必須在發生流產（包括自然或人工）、子宮外孕輸卵管破裂、羊膜穿刺、或腹部外傷後72小時內使用HyperRH0 S/D Full Dose，除非胎兒或胎兒的父親也確定是Rho(D)陰性。(7, 8)如果無法確定胎兒的血型，先假設他是Rho(D)陽性，(2)並對母體使用HyperRH0 S/D Full Dose。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

本製劑由人體血漿製成，凡是由人體血漿製成的產品可能含有如病毒等感染物質而致病。本劑不可靜脈注射，只能肌肉注射，同時新生兒勿用。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

注射處可能會覺得短暫疼痛，體溫可能會暫時輕微上升。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍)；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師