

用藥指導單張

衛教小組 DC1840101

學名：Vigabatrin
商品名：SABRIL 500MG
中文名：赦癲易膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

抗癲癇之輔助療法。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本品是以口服方式給藥，每日1~2次可於飯前，飯後服用。患者即使目前正接受其他藥物治療，本藥亦可加入該療程。

1. 成人：開始每日劑量為2公克(四錠)如需要，劑量可再增加0.5~1.0公克，依其臨床上的反應和耐受性而定。但若增加劑量至四公克/每日，並不會更有效。藥物血漿濃度和效果之間並無相關性，藥物作用時間端視酵素(GABA轉氨酶)再合成速度而非視血漿中藥物的濃度而定。

2. 兒童：開始劑量為40mg/kg/day可依其反應增加至80~100mg/kg/day。若依整錠服用方式，其劑量可為：體重10~15公斤：1~2錠/每日，15~30公斤：2~3錠/每日，30~50公斤：3~6錠/每日，>50公斤：4~8錠/每日。嬰兒併有西方症狀(West Syndrome)者，可給予以100mg/kg/day的劑量或更高。

3. 老人：劑量可以調整降低以利使用於患有腎功能不全之患者，特別是肌氨酸肝廓清值低於60mL/min。請參考注意事項。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 和其他抗癲癇藥物一樣，突然停藥可能引起癲癇再式次出現。甚或更嚴重如治療必需停止則需以漸減方式減少劑量時間需超過2~4星期。

2. 本品使用於有精神病史者或是行為異常者應小心。(請參考副作用)

3. 本品經由腎臟排泄，因此用於老年患者須特別注意。尤其是肌氨酸肝廓清值少於60ml/min時，其劑量應減輕並加以嚴密為視其不良反應。如：鎮定和思想不集中。

4. 動物安全性研究指出，本品引起腦部白色物質束的內部髓鞘質的水腫。

5. 目前無證據顯示其對人體之影響；無論如何，患者以本品治療須加以嚴密監視其對神經方面的不良反應。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC1840101

學名：Vigabatrin

商品名：SABRIL 500MG

中文名：赦癲易膜衣錠



6. 駕駛能力之影響：臨床上會有倦怠感出現，所以患者在治療時應被提示此點。所以，駕駛者，操作機器者，或是執行任何危險工作者用藥應特別小心。

7. 高劑量可能會造成新生兒唇裂。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

不良反應常和中樞神經方面有關之反應、這可能是因本品會增加GABA而造成神經方面的第二次反應結果，侵略性和精神病曾出現於有關之精神病史或行為異常之患者、其他報告如：困倦、疲勞、暈眩、神經緊張、激動性、精神抑鬱、頭痛、精神不集中、記憶失常、幻覺產生、如：複視。其他不良反應：體重增加，輕微的胃腸道副作用。孩童可能有過度興奮和激動等現象。本品之鎮定作用會隨着藥物持續使用而降低。正如其他抗癲癇藥物一般會有一些患者使用本品增加癲癇頻率，尤其是患有間歇性肌痙攣的癲癇患者。無任何證據顯示其對人體有神經毒性。以試驗測試其神經方面之副作用亦無反應。包括：喚起之潛在性，掃描攝影術，磁場共振Imaging，腦髓液分析和一些少數的病例的腦部樣本的神經病理檢查。實驗室數據指出，本品治療並不引起腎和肝毒性。SGOT和SGPT值的降低乃是因為本品對轉氨酶的抑制作用結果。以本品做慢性治療將可能有輕微的血紅素降低現象，但罕見有臨床上徵兆。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師