用藥指導單張

衛教小組 DJ10350201

學　名：Diphtheria, Pertussis, Tetanus

商品名：BOOSTRIX 0.5ML(自費)

中文名：補施追疫苗



一、此藥品的用途是什麼？

Boostrix 適用於四歲(含)以上者之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風及百日咳。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 本疫苗的建議施打劑量為單劑0.5毫升。
2. 適用於肌肉深部注射，並以三角肌為優先注射部位。

三、使用時我該注意的特別事項？

如同其他疫苗，若有嚴重的急性發燒疾病，應延後接種。輕度感染則不在此限。 在接種疫苗之前，應先審閱其病歷(特別是有關其先前之疫苗接種與可能發生之不良事件記錄)，並進行臨床診察。

如果已知曾經暫時性地發生下列任一與接種含有百日咳抗原之疫苗有關的現象，則在決定接種下一劑含有百日咳抗原成分的疫苗時，應小心考量。

(1) 接種疫苗後的48小時內，體溫 ≧ 40.0℃，且非導因於其他可確認之因素；

(2) 接種疫苗後的48小時內，呈現虛脫或類似休克的狀態(低壓性-低反應性現象)；

(3) 接種疫苗後的48小時內，持續不停地啼哭 3小時；

(4) 接種疫苗後的三天內，發生併有或未併有發燒的痙攣現象。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位疼痛、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

應貯存於+2℃至+8℃之間。運送過程中應遵守建議之貯存條件。切勿冷凍，本疫苗如果已經冷凍，則應丟棄不用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11