

用藥指導單張

衛教小組 DM9940101

學名：Clarithromycin

商品名：klaricid (注射) iv 500mg

中文名：開羅理黴素靜脈注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

Klaricid IV 500mg 適用於治療因受下列有感受性微生物所引起之感染症：

1. 下呼吸道感染（如，支氣管炎、肺炎）
2. 上呼吸道感染（如，咽炎、鼻竇炎）
3. 皮膚及軟組織感染（如，毛囊炎、蜂窩組織炎、丹毒）
4. 由禽結核桿菌（Mycobacterium avium）或胸胞內分枝桿菌（Mycobacterium intracellulare）所引起之散發性或局部分枝桿菌感染。由龜結核桿菌（Mycobacterium chelonae）、偶然結核分枝桿菌（Mycobacterium fortuitum）或堪薩斯分枝桿菌（Mycobacterium kansasii）引起之局部感染

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

僅供靜脈注射。

成人：

18歲(含)以上之成人的clarithromycin 靜脈注射劑建議劑量為1g/天，等分成二次劑量，以適當的靜脈輸注液稀釋，每一次靜脈輸注期間為60分鐘。

老人：

用法用量如成人。

腎功能不全患者：

不建議腎功能不全患者使用本品。

建議用法：

Klaricid IV 500mg應以約2mg/ml 的濃度，由其中一條較大的近側靜脈輸注60分鐘。Clarithromycin 不可以快速靜脈注射或肌肉注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 在未對懷孕婦女小心衡量治療效益及危險性，特別是在懷孕的前3個月內，醫師不應對懷孕婦女開clarithromycin 的處方。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM9940101

學名：Clarithromycin

商品名：klaricid (注射) iv 500mg

中文名：開羅理黴素靜脈注射劑



2. 對腎功能不全的患者應避免使用本品。
3. Clarithromycin 主要由肝臟代謝。因此，對肝功能不全之患者應謹慎使用此種抗生素。
4. Klaricid IV 500mg 應以約2mg/mL的濃度，由其中一條較大的近側靜脈輸注60分鐘。Clarithromycin 不可以快速靜脈注射或肌肉注射。

準備使用：

1. 加入10ml的無菌注射水至含500毫克的小瓶中，可調配成 clarithromycin 靜脈注射劑的初步溶液。
2. 給藥前須將調配後的初步溶液(500毫克於10毫升的無菌注射用水中)加入下列其中一種稀釋溶液至少250毫升：5%葡萄糖乳酸林格氏液、5%葡萄糖、乳酸林格氏液、5%葡萄糖於0.3%氯化鈉生理食鹽水、Normosol-M於5%葡萄糖、Normosol-R 於5%葡萄糖、5%葡萄糖於0.45%氯化鈉生理食鹽水、0.9%氯化鈉生理食鹽水。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

分佈、生物轉化(biotransformation) 與排除

使用 clarithromycin 發生頻率最高與最常見的不良反應，在成人及兒童皆為腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及味覺錯亂。

六、此藥儲存時的條件為何？

以原藥瓶儲存於30°C 以下。初步調配後之注射液（貯存於5-25°C）需於24 小時內使用完。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師