
用藥指導單張

衛教小組 DM13830101

學　名：Isoproterenol

商品名：ISOPROTERNOL INJ. ★ 0.2MG/1ML

中文名：樂普他諾注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

有症狀之高度房室傳導阻斷、（阿丹斯 - 史妥克斯症候群）支氣管氣喘及支氣管痙攣、休克、心肌衰竭。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.點滴靜注：0.2-1.0mg(1-5Amp)溶於200-500ml之等張溶液中，視心拍數或心電圖注射。

2.急救時：0.2mg(1Amp)溶於等張液20ml內，將其2-20ml徐緩注射於肌肉或皮下；於心臟即將停止時可使用0.02-0.2mg(0.1-1Amp)直接注射於內心。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.注射投與時應不斷的監測心電圖，且需有氧氣及其他呼吸輔助器備用。

2.休克患者在輸液時若心搏率超過每分110次則應減少或停止輸液，因有不整脈之危險。

3.監測血壓，心搏率，節率，心電圖，尿量，血液pH和PCO2，調整輸液速率以維持上述測量之穩定度。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

發疹、頭痛、震顫、眩暈、發汗、神經過敏、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、腸鼓。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06