

用藥指導單張

衛教小組 DM15710101

學名：Immunoglobulins, normal human, for intravascular

商品名：privigen TW 10% 50ML (依診斷事審)

中文名：第二代國血製劑益康人體免疫球蛋白靜脈注射液



一、此藥品的用途是什麼？

作為替代療法

• 原發性免疫不全症 (PID) 如：

- 先天性丙種免疫球蛋白缺乏症及丙種免疫球蛋白過低症 - 常見變異性免疫不全症

- 嚴重複合型免疫不全症

- Wiskott-Aldrich 氏症候群

• 慢性淋巴性白血病引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且預防性抗生素治療無效的病人。

• 多發性骨髓瘤穩定期引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且施打肺炎鏈球菌疫苗無效的病人。

• 異體造血幹細胞移植後引致丙種免疫球蛋白過低。

• 先天性愛滋病 (AIDS) 伴隨復發性細菌感染者。作為免疫調節 • 免疫性血小板缺乏紫斑症 (ITP)，且具高出血風險或用於手術前矯正血小板計數

• 格林-巴利症候群川崎氏症 (與乙醯水楊酸 acetylsalicylic acid 一起使用；請參閱“劑量/用法”章節。)

• 慢性脫髓鞘多發性神經炎 (CIPD)，對孩童的使用經驗有限。

• 多灶性運動神經病變 (MMN)

• 重症肌無力惡化 (MG)

• 藍伯 - 伊頓肌無力症

• 僵體徵候群

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM15710101

學名：Immunoglobulins, normal human, for intravascular

商品名：privigen TW 10% 50ML(依診斷事審)

中文名：第二代國血製劑益康人體免疫球蛋白靜脈注射液



劑量與給藥次數視適應症而定。

原發性免疫不全症的替代療法 (PID)

此療法的劑量，建議應使血清中IgG最低濃度 (trough level, 於下次輸注前測得) 至少為6 g/L或該族群年齡的正常參考範圍內。

建議起始劑量為0.4 – 0.8 g/kg bw, 之後每3 – 4週輸注0.2 – 0.8 g/kg bw(2至8 mL/kg)。如果病人錯過一劑治療，應儘速補接受錯過的治療，並恢復每3 – 4週的定期治療。

慢性淋巴性白血病引致三種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且預防性抗生素治療無效的病人；多發性骨髓瘤穩定期引致三種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且施打肺炎鏈球菌疫苗無效的病人；先天性愛滋病(AIDS)伴隨復發性細菌感染者的替代療法

繼發性免疫缺乏疾病（如治療適應症所定義）

劑量應達到至少6 g/L的最低濃度IgG值（在下次輸注之前測量）或在該族群年齡的正常參考範圍內。

建議劑量為每3 – 4週0.2 – 0.4 g/kg bw。

異體造血幹細胞移植後引致三種免疫球蛋白過低的替代療法

建議劑量為每3 – 4週0.2 – 0.4 g/kg bw。血清中IgG最低濃度應維持高於5 g/L。

。

免疫調節

免疫性血小板缺乏紫斑症 (ITP)

建議劑量為第一天施以0.8 到1 g/kg bw, 在三天內，可再重覆給與一次同樣的劑量，或每日給與0.4 g/kg bw, 持續2 – 5 天。若有復發情形，可重複治療。

針對發生血栓栓塞、溶血、急性腎損傷或體液容積過剩 (volume overload) 風險較高的病人，在給予高劑量免疫球蛋白治療（如給予1 g/kg /天持續2天）前，應仔細評估相對利益與風險。

格林-巴利症候群 (Guillain-Barré Syndrome) （如果復發，可以重複給藥）

0.4 g/kg bw/day, 給與約5天。對孩童的使用經驗有限。

川崎氏症 (Kawasaki Disease)

應該單次給予總劑量為2.0 g/kg bw。病人應合併接受乙醯水楊酸 (acetylsalicylic acid) 的治療。

慢性脫髓鞘多發性神經炎 (CIDP)

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM15710101

學名：Immunoglobulins, normal human, for intravascular

商品名：privigen TW 10% 50ML (依診斷事審)

中文名：第二代國血製劑益康人體免疫球蛋白靜脈注射液



建議起始劑量為 2 g/kg bw，並於連續2 - 5天內分次給與。後以1 g/kg bw的維持劑量，每3週於1天或連續2天內分次給予。每個週期後應評估治療效果；如果六個月後仍未見到治療效果，應停止治療。

用法

注意：第二代”國血製劑益康”人體免疫球蛋白靜脈注射液 10%不含抗微生物防腐劑，因此開瓶後必須立即使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

某些嚴重不良反應可能與輸注速率有關。對於 IVIg 的反應通常與輸注速率相關，且極可能在輸注的第 個 時內發。務必嚴格遵循法量之法所列的建議輸注速率。整個輸注期間及輸注後必須密切監測病，並仔細觀察是否出現任何症狀。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

冷顫、頭痛、暈眩、發燒、嘔吐、過敏反應、噁心、關節疼痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 25° C 以下（請勿冷凍）。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師