用藥指導單張

衛教小組 DB14050101

學　名：Trimetoquinol

商品名：TRIMSOAN 3MG

中文名：喘嗽安錠



一、此藥品的用途是什麼？

慢性支氣管炎、塵肺症、支氣管喘息引起之氣道閉塞症狀之緩解。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人一次一錠，一天二~三次，並依年齡症狀斟酌增減，本劑須由醫師處方使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

一般的注意：

a. 依用法及用量的規定使用，亦未出現效果時，可能是本劑的使用為不適應，宜停用。又小兒投與應正確指導使用法，並要仔細觀察其經過。

b. 用量的持續使用可能會發生心律不整時宜減量使用或停用。

慎重投與：甲狀腺機能亢進症、高血壓、心疾患、糖尿病。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

a. 循環器系：有時出現心悸亢進或罕見血壓變動、胸部壓迫感。

b. 精神神經系：有時出現頭痛或罕有震顫、頭暈、熱感。

c. 胃腸道：有時出現噁心、食慾不振。

d. 過敏症：若出現發疹等過敏症時要停用。

e. 其他：有時出現口渴。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03