

用藥指導單張

衛教小組 DL10650101

學名：Quetiapine

商品名：QTING ORAL SUSP. 25MG/ML, 120ML

中文名：康停懸液劑



一、此藥品的用途是什麼？

思覺失調症，雙極性疾患之躁症發作。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人：

思覺失調症：

治療前四天之每日劑量為第一天50 mg，第二天100 mg，第三天200 mg，第四天300 mg。第四天以後，劑量應逐漸調整至每日300-450 mg 的一般有效劑量。依個別病人的臨床反應及對藥物的耐受性，每日劑量範圍通常在150-750 mg 間。

雙極性疾患之躁症發作：

作為單一療法或作為情緒穩定劑的輔助治療。治療前四天之每日劑量為第一天100mg，第二天200 mg，第三天300 mg，第四天400 mg。劑量可依個別病人的臨床反應及對藥物的耐受性在每日200-800 mg之間加以調整，一般有效劑量在每日400-800 mg 的範圍之間。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 服用抗精神病藥物的老年失智症病人有較高的死亡風險。Quetiapine未核准用於治療老年失智症病人。
2. 患有重鬱症病患（包括成人和兒童），不管他們是否正在服用抗鬱劑，都可能經歷到憂鬱症狀加重和 / 或出現自殺意念和行為或不尋常的行為變化，此種風險會持續到症狀明顯緩解為止。
3. 本品為一種非典型抗精神病藥品，使用非典型抗精神病藥物會出現高血糖及增加罹患葡萄糖耐受性不良或糖尿病風險。應密切留意高血糖症狀，包括多食、劇渴、多尿或無力，用藥期間若出現高血糖症狀，應立刻測量血糖值。
4. Quetiapine可能引發姿勢性低血壓，伴有頭暈、心悸過速，有些病人會昏厥，特別是在最初的劑量調整期間，可能反映其 α_1 腎上腺素性拮抗劑性質。
5. 曾有報告顯示使用 quetiapine 時出現睡眠呼吸中止症。在伴隨使用中樞神經系統抑制劑的病人、曾有睡眠呼吸中止症或有睡眠呼吸中止症風險的病人（如：過重/肥胖或男性）在使用quetiapine 時須注意。
6. 如同其他的抗精神病藥物一般，有癲癇發作病史或者可能降低癲

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL10650101

學名：Quetiapine

商品名：QTING ORAL SUSP. 25MG/ML, 120ML

中文名：康停懸液劑



癇發作閥值之疾病（如阿茲海默氏症）的病人，使用quetiapine治療應小心。

7. 因為Quetiapine 可能會損害判斷、思考或運動技巧，應警告病人在合理地確定quetiapine 治療對他們沒有不良的影響之前，應小心從事需要精神警覺性的活動，例如駕駛（包括開車）或操作危險的機器。嗜睡可能導致跌倒。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

嗜睡、頭暈、口乾、便秘、ALT升高、體重增加和消化不良。

六、此藥儲存時的條件為何？

請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。（開封使用90日後丟棄）。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師