


# 用藥指導單張

衛教小組 DC9950101

學名：Sodium valproate

商品名：DEPAKINE ORAL SOL'N 200MG/ML, 8000MG (液劑)

中文名：帝拔癲液



## 一、此藥品的用途是什麼？

1. 無急性發作的單純和複雜的癲癇，包括小發作(單獨或其他抗驚厥劑併用)。2. 可做為多重性癲癇發作類型的輔助治療劑，包括大發作，肌強直性(myoclonic)，缺乏非定型的複雜性部份或無張力的癲癇發作。

癲癇之大發作、小發作混合血液型及顳葉癲癇。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量

每 24 小時平均劑量如下：

孩童：30mg/kg (建議使用口服液劑)。

青少年及成人：20~30mg/kg (建議使用錠劑或持續性藥效錠之劑型給藥)。

處方應以 mg 為單位，每瓶的帝拔癲口服液隨藥附有一支有劑量(mg)刻度指示的調劑針筒。

用法

口服使用。僅可使用瓶內所附的調劑針筒量取。

每日劑量分次服用如下，建議與餐點同時服用。

一歲以下的病人分兩次服用。

一歲以上的病人分三次服用。

帝拔癲口服液應以少量非發泡性飲料稀釋後服用。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

1. 服用本品患者宜事先先檢查肝功能，之後還得定期檢查。
2. 服用本品的患者不宜開車或從事危險性的工作。
3. 本品會造成尿酮檢驗結果誤判，糖尿病檢查時宜謹慎。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


# 用藥指導單張

衛教小組 DC9950101

學名：Sodium valproate

商品名：DEPAKINE ORAL SOL<sup>'N</sup> 200MG/ML, 8000MG (液劑)

中文名：帝拔癲液



此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、消化不良、鎮靜、延長出血時間、睏倦、發燒、虛弱、手發抖、掉頭髮、不正常出血、血清中轉胺酶和LDH濃度提高。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師