
用藥指導單張

衛教小組

學　名：Tacrolimus

商品名：advaGRAF 1MG(中劑量)

中文名：安瑞福持續性藥效膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

成人肝、腎移植之第一線用藥或成人肝、腎移植cyclosporin 無效之第二線用藥。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Advagraf® 的口服每日劑量建議在每天早上一次服用。從鋁箔片取出Advagraf®持續藥效膠囊之後應該立即服用。應告知患者不要誤服乾燥劑。膠囊應以液體吞服（最好是水）。Advagraf® 應空腹服用，或者至少在飯前1 小時或飯後2-3小時服用，以達到最大吸收（見藥動學性質）。如果早上忘記服藥，應盡快在當天補服。第二天早上不可服用雙倍劑量。

建議劑量-腎臟移植： 預防移植排斥作用。 口服Advagraf® 治療應該以0.20-0.30毫克/公斤/天的劑量開始，每天早上服用一次。應該在移植手術完成後24 小時內開始給藥。 移植手術後期間的劑量調整： Advagraf® 的劑量在移植手術後期間通常會減低。

建議劑量-肝臟移植： 預防移植排斥作用。 口服Advagraf® 治療應該以0.10-0.20毫克/公斤/天的劑量開始，每天早上服用一次。應該在移植手術完成後約12-18 小時開始給藥。 移植術後期間的劑量調整： Advagraf® 的劑量在移植手術後期間通常會減低。

建議劑量-由Prograf 治療轉換為Advagraf® 治療： 持續服用 Prograf 膠囊一天兩次，而需要轉換為Advagraf® 一天一次的移植患者應該根據每日總劑量一比一（mg:mg）的方式轉換。Advagraf® 應在早上服用。 轉換後應監測tacrolimus 的血中濃度谷值，需要時調整劑量以維持相似的全身暴露量。

三、使用時我該注意的特別事項？

因為Advagraf® 持續藥效膠囊含有乳糖，對於有半乳糖不耐症、缺乏Lapp 乳糖酶、或有葡萄糖-半乳糖吸收障礙等少見遺傳疾病的患者要特別小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20


用藥指導單張

衛教小組

學　名：Tacrolimus

商品名：advaGRAF 1MG(中劑量)

中文名：安瑞福持續性藥效膠囊



C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

震顫、頭痛、腹瀉、噁心、腎功能不全、血糖過高、糖尿病、高鉀血症、高血壓。

六、此藥儲存時的條件為何？

保存在原包裝內，並置於 30℃以下乾燥處以免受潮。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20